


| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | | Somatikk Arendal | | Prosedyre | |
| Kenacortinjeksjon | | | | | Side 1 av 2 |
| Dokument ID: II.SOA.ØYE.2.8.2-11 | | Godkjent dato: 02.06.2023 | Gyldig til: 02.06.2025 | Revisjon: 4.00 | |

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Poliklinikk

Formål

Langtidsvirkende kortisoninjeksjon som settes subtenonalt.

Forbehandling

Drypp øyet med Oxibuprokain 4 mg/ml og Tetrakain 10 mg/ml

Instrumenter og medikamenter

- Desmarres hake
- Anatomisk pinsett

- Xylocain/Adrenalin 10 mg/ml (anestesi)
- Mini-spike
- Sprøyte 2 ml
- Gul kanyle 30G

- Kenacort-T 40 mg/ml
- Sprøyte 2 ml
- Orange kanyle 25G
- Opptrekkskanyle 19G

Fremgangsmåte

- Trekk opp 1 ml Kenacort
- Pasienten settes til rette i liggestol
- Anestesi/behandling utføres av lege.

Kode

CAX20

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utarbeidet av: Ann Karin Bjurstrøm | Fagansvarlig: Espen Ringvold | Godkjent av: Espen Ringvold | |
|--|--|---------------------------------------|--|

Dokument-id:
II.SOA.ØYE.2.8.2-11Utarbeidet av:
Ann Karin BjurstrømFagansvarlig:
Espen RingvoldGodkjent
dato:
02.06.2023Godkjent av:
Espen RingvoldRevisjon:
4.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Poliklinikk