

B03A C	JERN-(III)-derisomaltose Monofer® (Pharmacosmos A/S)			Blandekort Voksne Føde/Barsel SSHF
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
100 mg/ml injeksjons-/infusjons-væske, ampuller, hetteglass	<u>Fortynningsvæske¹:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV infusjon¹ fortynning:</u> Fortynnes med maksimalt 500 ml NaCl 9 mg/ml <u>Minimumskonsentrasjon:</u> 1 mg jern/ml	<u>IV infusjon¹:</u> Doser ≤ 1000 mg gis over minst 15 minutter Doser > 1000 mg gis over minst 30 minutter	<u>Ampulle^{1,2}:</u> Engangsbruk <u>Anbrutt hetteglass^{1,2}:</u> Høyst 12 timer i RT 24 timer i KJ	AMMING ¹ : Forenelig med amming. VANLIGE BIVIRKNINGER ¹ : Kvalme, reaksjoner på injeksjons-/infusjonssted (erytem, hevelse, svie, smerte, blåmerke, misfarging, ekstravasasjon, irritasjon). Paravenøs lekkasje kan gi hudirritasjon og potensielt langvarig brun misfarging på administrasjonssted. Ved paravenøs lekkasje må administrasjon avbrytes øyeblikkelig.
Konsentrasjon: 100 mg/ml	<u>Anbefaling:</u> 500 mg fortynnes med 100 ml NaCl 9 mg/ml 1000 mg fortynnes med 250 ml NaCl 9 mg/ml	Pasienten bør observeres under og i minst 30 minutter etter hver administrasjon ¹	<u>Fortynnet Løsning^{1,5}:</u> Høyst 8 timer i RT	
Tilleggsopplysninger:				
<p>Dosering ved anemi etter fødsel^{3,4}: Ved Hb < 9 g/dl med symptomer på anemi, vurder intravenøs jernbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 mg som <u>engangsdose, IV infusjon</u>. <i>Kroppsvekt < 50 kg: 500 mg</i> som <u>engangsdose, IV infusjon</u>. • En enkeltdose må ikke overskride 15 mg/kg kroppsvekt. Ytterligere 500 mg kan evt. gis etter en uke¹. • Peroralt jern bør ikke gis samtidig med IV jern fordi absorpsjon av oralt jern kan bli redusert¹. <p>OBS¹: Risiko for overfølsomhetsreaksjoner, særlig hvis IV injeksjon/ infusjon skjer for raskt. Kan gi anafylaktiske/ anafylaktoide reaksjoner som er alvorlige/potensielt dødelig. Anafylaksiberedskap etter enhetens rutiner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Akutte</i>: Opptrer vanligvis de første minuttene etter oppstart av infusjon. • <i>Forsinkede</i>: Debut fra noen timer inntil 4 dager etter infusjon av IV jern, varer vanligvis 2-4 dager. <p>Forkortelser: NaCl = Natriumklorid. IV = Intravenøst. RT = romtemperatur (15-25°C); KJ = kjøleskap (2-8°C).</p>				
<p>Referanseliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler (SPC), Monofer (jern-(III)- jernerisomaltose) (oppdatert 11.08.2022, sitert 13.01.2023). Tilgjengelig fra: 08-6145.pdf (legemiddelverk.no). 2. Statens legemiddelverk, Norsk legemiddelstandard, kap. 6, Oppbevaring og merking, veiledende maksimale brukstider for sterile legemidler etter anbrudd, 2023.0 (oppdatert 01.01.2023, sitert 13.01.2023). Tilgjengelig fra: Veiledende maksimale brukstider for legemidler etter anbrudd - Legemiddelverket 3. Prosedyre I.4.13.1.5-26, Anemi i svangerskap og etter fødsel SSHF, Kvinneklinikken, EK-web (versjon 6.00 av 03.06.2022; sitert 16.01.2022). Tilgjengelig fra: https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok17780.pdf 4. Anbefalt dosering IV jern ved anemi etter fødsel, avsnitt for Monofer® (jernerisomaltose), Barselpleie – anemi etter fødsel, Norsk Gynekologisk forening, kap. 46, Veileder i fødselshjelp 2020 (sist revidert 19.06.2020, sitert 13.01.2023). Tilgjengelig fra 46. Barselpleie - anemi etter fødsel (legeforeningen.no) 5. E-post svar 20.01.2023, A S Jørgensen, Pharmacosmos, stabilitet i romtemperatur av fortynnet Monofer Farmacosmos 100 mg/ml inf./inf.væske, forespørsel fra L. Vesterhus, Sykehusapoteket Kristiansand, 17.01.2023 				
Utarbeidet av Sykehusapoteket Kristiansand			Dato: 23.01.2023 (versjon 3.0) side 1 av 1	