

Informasjonsskriv til pasient ved ekstravasal/subkutan kontrastinjeksjon

Navn og fødselsdato:

Undersøkelsesdato:

Ved undersøkelsen ved Radiologisk avdeling fikk du kontrast i en blodåre. Uheldigvis gikk en del av kontrasten utenfor blodåren og inn i vevet omkring. Dette kan gi forbigående smerte, rødme og hevelse av hånden/armen.

For å redusere hevelsen/smerten, er det viktig at du selv behandler dette ved å gjøre følgende:

1. Legg armen høyt, for eksempel på en pute, for å avhjelpe hevelsen.
2. Massør gjerne over området.
3. Legg kaldt omslag på området omkring innstikksstedet/aktuelle området (for eksempel en plastikkpose med isbiter pakket inn i håndduk) i 30 minutter av gangen, flere ganger daglig i 1-3 dager hvis du har problemer.

Dersom denne behandlingen ikke hjelper, eller om hevelsen/smerten blir verre, er det viktig at du kontakter din fastlege eller legevakt.
Ta med dette brevet til legen du oppsøker.

Med vennlig hilsen

Sørlandet sykehus HF
Radiologisk avdeling

Besøksadresse:

Arendal

Sykehusveien 1
4838 Arendal

Kristiansand

Egsveien 100
4615 Kristiansand

Flekkefjord

Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord

**Administrasjonsadresse
Sørlandet sykehus HF**

Postboks 416
4604 Kristiansand

Telefon
906 10 600

**Foretaksregisteret
NO 983 975 240 MVA**

Hjemmeside
www.sshf.no

e-post
postmottak@sshf.no