

		Klinikknivå			Prosedyre
Weber A og B behandling - AIO - Akuttmottak - SSA					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOA.AIO.SSA.2.a-18		Godkjent dato: 28.01.2024	Revideres innen: 28.01.2026	Sist endret: 28.01.2024	Revisjon: 0.02

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/AKUTTMOTTAK/Pasienter og brukere
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 28.01.2026

HENSIKT

Riktig behandling av denne type ankelfraktur

MÅLGRUPPE

Sykepleier, hjelpepleier og leger

FREM GANGSMÅTE


Pasienter med Weber A og B frakturer skal behandles i 1 uke med kalkgips og forsterkning under hæl med Scotchcast, og stiv såle. Pasienten kan belaste til smertegrense.

Pasienten kommer til kontroll om en uke og tar nytt røntgenbilde uten gips.

Hvis røntgen viser at bruddet står i uforandret stilling, kan pasienten få Aircast (plastortose) eller Walker ortose (støvel) med full belastning til smertegrense.

Får pasienten økende smerter bør ny røntgen vurderes.

Avsluttende kontroll 6 uker etter skadetidspunkt.

Utarbeidet av: Mona Haslemo	Fagansvarlig: Håkon Brenna Pedersen	Verifisert av: 	Godkjent av: Ikke styrt	Dok.nr: D49100
---------------------------------------	---	---	-----------------------------------	--------------------------