

		Klinikknivå			Generelt dokument
BOTOX - behandling, Med. avd. SSK					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-63		Godkjent dato: 26.09.2024	Revideres innen: 26.09.2026	Sist endret: 26.09.2024	Revisjon: 5.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

BOTOX – BEHANDLING

Indikasjon/ formål

- Achalasi
- Anal spasmer

Lokal behandling av muskelspasmer i øvre og nedre lukkemuskel i spiserøret og i den anale lukkemuskel.

Medikamentet

- Ved gastroskopi Xeomin 100 E
- Ved anoskopi Xeomin 50 E (Behandlingen utføres av kirurgene)

Utstyr ved gastroskopi


- Et hetteglass Xeomin 100 E, inneh.100 IE clostr.botulin.
- 4 ml saltvann
- Injeksjonsnål
- 4 stk. 1 ml sprøyter

Fremgangsmåte

- Tilsett 4 ml saltvann i hetteglasset. Det er viktig at væsken settes forsiktig ned i glasset langs veggen. Dette for å ikke ødelegge innholdet i glasset.
- Trekk opp 1 ml av blandingen i de fire 1 ml sprøytene
- Fyll injeksjonsnålen som tar **1,7 ml**
- Du har da igjen 2 sprøyter med 1 ml Botox oppløsning, pluss en sprøyte med 0,3 ml Botox

Oppløsningen settes på følgende måte:

1. 1ml botox settes
2. 1ml botox settes
3. 0,3 ml botox + 0,7 ml Nacl
4. 1 ml Nacl

Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Janicke Lindebø Aamot	Verifisert av: 	Godkjent av: Audun Hasund	Dok.nr: D49113
--	---	---	-------------------------------------	--------------------------

Utstyr ved anoskopi

Et hetteglass Xeomin 50 E, inneholder 50 IE clost. botulin.
25 IE pr. behandling

- 2 ml saltvann
- 2 sprøyter à 1 ml.
- Blå kanyler til injeksjon.

Fremgangsmåte

- Tilsett 2 ml saltvann i hetteglasset. Det er viktig at væsken settes forsiktig ned i glasset mot veggen. Dette for å ikke ødelegge innholdet i glasset.
- 1 ml trekkes opp (25 IE)
- Ferdig oppløsning er holdbar i 24 timer ved 2 - 8 grader.

Oppløsningen settes på følgende måte:

- Kirurgen setter ½ ml på 2 punkter i anus. 1 ml til sammen.