

ØNH-pasienter - mottak av pasient - akuttmottak SSK

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOK.MEK.SSK.2.a-28

Godkjent dato:

21.05.2024

Revideres innen:

21.05.2026

Sist endret:

21.05.2024

Revisjon:

5.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Prosedyren skal sikre at Øre-nese-hals-pasienter som legges inn akutt får rask og forsvarlig behandling i akuttmottaket.

MÅLGRUPPE

Prosedyren gjelder for leger og sykepleiere som har ansvar for ØNH-pasienter i akuttmottaket.

FREM GANGSMÅTE

Ustabile ØNH-pasienter, inkludert pasienter med mistenkt sepsis	<ul style="list-style-type: none"> • Tas imot på akuttrom • ØNH lege tilkalles • KIR LIS1 og ved behov anestesilege ivaretar pasienten til ØNH-lege kommer
Stabile pasienter med neseblødning (epistaxis)	<ul style="list-style-type: none"> • Tas imot på skadepoliklinikken av LIS 1 med assistanse fra skadepol/akuttmottakssykepleier • Stabile pasienter som skal innlegges: KIR LIS1 tar innkomst og forordner evt. væske, smertelindring • Kan eventuelt tas imot på ØNH-poliklinikk hvis vakthavende ØNH lege ønsker dette. <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasienten følges av portør ○ Ved behov for assistanse på ØNH-pol, kontaktes LIS1 Kirurgi ○ Akuttmottakssykepleier bistår ved behov, dersom akuttmottaket har kapasitet ○ Hvis pasienten blir ustabil på poliklinikken, bør pasienten flyttes til akuttrom ○ Dersom pasienten er svært påvirket, tilkalles stansteamet • Legen avgjør hvilken tamponade som skal brukes. Aktuelle tamponader: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ballongtamponade: Denne smøres med Xylocain gel før den puttes i nesa. Saltvann settes inn i bakre (hvit) og fremre (grønn) ballong. Legen avgjør hvor mye. Antall ml føres på pasientens kurve (Epistat, Rapid Rhino) ○ Surgicel-tampong: Dette er en gastampong som er innsatt med et blodstoppende middel. Små tamponger blir i enkelte tilfeller liggende i nesa uten å fjernes; de vil løse seg opp og forsvinne litt etter litt ○ Merocel-tampong: Denne fuktes med NaCl, eller med Adrenalin m/Tetrakain etter at den er satt inn i nesa slik at den sveller opp (Absorb ENT) ○ Bakre tampong: Brukes sjelden. Aktuelt ved bakre neseblødninger. En ballong ligger i epipharynx. Denne står urørt i 24-48 timer, tar så ut litt NaCl av ballongen ettersom legen bestemmer, eventuelt setes det inn mer NaCl hvis blødning
Utstyr ved neseblødning	<ul style="list-style-type: none"> • Diatermiapparat (us. 3), ØNH-bakke står i skapet i mellomgangen på skadepol (v/krykkene) • Innhold ØNH-bakke: <ul style="list-style-type: none"> ○ 20 ml sprøyte m/luer lock ○ Grønn kanyle ○ 4 x NaCl 9 mg/ml 10 ml ○ 4 x sterilt vann (til fukting av rapid rhino) ○ 2 pakke Surgicel-tampong (5 x 35 cm) – ekstra på lager skadepol ○ 2 Merocel-tamponger (4,5 cm lange) – ekstra på lager skadepol ○ 2 Merocel-tamponger (8 cm lange) – ekstra på lager skadepol ○ 2 Merocel-tamponger (10 cm lange) – ekstra på lager skadepol ○ 1 Ballongtampong (Epistat Nasal Catheter) – ekstra på lager skadepol ○ Rapid Rhino enkel – ekstra på lager skadepol ○ Rapid Rhino dobbel – ekstra på lager skadepol ○ 1 stor og 1 liten nesespekulum – ekstra i skap skadepol v/krykkene

 Utarbeidet av:
**O. Tengs/R.G
 Thue/K.Langmyr**

 Fagansvarlig:
Anne Catrine Nyberg

 Verifisert av:
 □

 Godkjent av:
Anne Catrine Nyberg

 Dok.nr:
D49765

Dokument-id:
 II.SOK.MEK.SSK.2.a-28

 Utarbeidet av:
 O. Tengs/R.G
 Thue/K.Langmyr

 Fagansvarlig:
 Anne Catrine Nyberg

 Godkjent dato:
 21.05.2024

 Godkjent av:
 Anne Catrine Nyberg

 Revisjon:
 5.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 nesetampong tang – ekstra i skap skadepol v/krykkene • Plassering av annet utstyr/legemidler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Terra-Cortil-salve: kjøleskap skadepol ○ Tetrakain/Xylocain medisinerrom hylle 17 • Nødvendig tilleggsutstyr: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pussbekken ○ Cellestoff ○ Glass med kaldt vann ○ Kald klut til panna <p>Bakken fylles på etter bruk. Utstyr hentes på lageret til skadepol – gi beskjed hvis det begynner å bli tomt for utstyr (skaffevarer)</p>
Kutt i ansikt	Hos barn, skal konfereres med vakthavende ØNH lege før suturering

Kryssreferanser
Eksterne referanser