

C07AG01	<h1 style="text-align: center;">LABETALOL</h1> <p style="text-align: center;">(Labetalol S.A.L.F.; Trandate Aspen)</p>			<p style="text-align: center;">Blandekort Voksne Føde/Barsel SSHF</p>
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
<p>5 mg/ml Infusjons- /injeksjonsvæske, oppløsning, ampuller 20 ml</p> <p>Konsentrasjon: 5 mg/ml</p>	<p>Kan gis ufortynnet, eller fortynnet med NaCl 9 mg/ml^{1b,4}, eller Glukose 50 mg/ml^{1,4}</p> <p><u>IV infusjon</u>^{1,4} 100 mg (20 ml) fortynnes med 80 ml infusjonsvæske (Ad 80 ml: Trekk 20 ml fra 100 ml enhet)</p> <p><u>Konsentrasjon fortynnet løsning:</u> 1 mg/ml</p>	<p><u>IV injeksjon</u>^{1,3} 5 mg/ml ufortynnet løsning: Gis over 1-2 minutter</p> <p><u>IV infusjon</u>^{1,3} 1 mg/ml fortynnet løsning: Start med 20 mg/time, øk med 20 mg/time hvert 30. minutt inntil tilfredsstillende respons, eller maksimal dose 160 mg/time er nådd</p>	<p><u>Ampulle</u>^{1,2}: Engangsbruk</p> <p><u>Fortynnet løsning</u>^{1,2}: Inntil 24 timer i RT</p>	<p>AMMING⁵: Forenelig med amming.</p> <p>VANLIGE BIVIRKNINGER¹: Kongestiv hjertesvikt, ortostatisk hypotensjon, hypersensitivitet/overfølsomhet, legemiddelfeber, økte leverfunksjonsverdier, tett nese, <u>Bivirkning frekvens "ikke kjent", men relevant for barselkvinner:</u> Brystvortesmerter, Reynauds fenomen i brystvortene (følelseløse, fargeløse, smertefulle brystvorter)</p> <p>Ekstravasasjon kan gi vevsskade⁴</p>
<p>Tilleggsopplysninger¹: Forlikelig også med Ringer-laktat.</p> <p>Pasienten skal alltid ligge på rygg eller venstre side når legemidlet gis, og bli liggende 3 timer etter IV administrering av legemidlet (kraftig postural hypotensjon kan forekomme), overvåk blodtrykk ved injeksjon og infusjon.</p> <p>Dosering^{1,3}:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bolusdose, IV injeksjon: 5 mg/ml ufortynnet løsning labetalol Gi 20-40 mg (= 4-8 ml) over 1-2 minutter, hvert. 10.-15. minutt. Maksimal bolusdose: 200 mg (40 ml). Maksimal effekt vanligvis etter 5 minutter, virkning ca 6 timer (vanligvis), men kan vare i opptil 18 timer (halveringstid ca 4 timer). IV infusjon: 1 mg/ml fortynnet løsning labetalol Start med 20 mg/time (= 20 ml/time). Dosen økes med 20 mg/time (= 20 ml/time) hvert 30. minutt inntil tilfredsstillende respons er oppnådd, eller oppnådd maksimal dose 160 mg/time (= 160 ml/time). Hvis pasienten fortsatt trenger IV infusjon etter at 1000 ml av 1 mg/ml (= 1000 mg) labetalol er gitt Gi ufortynnet labetalol 5 mg/ml for å redusere intravenøs væsketilførsel. Bruk infusjonssprøyte. Doseringen i <u>mg</u> er den samme jfr. pkt 2 over. <p>Forkortelser: NaCl = Natriumklorid. IV = Intravenøs. RT = romtemperatur (15-25°C).</p>				
<p>Referanseliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> Legemiddelsøk, Direktoratet for medisinske produkter, preparatomtaler (SPC): a: Trandate 5 mg/ml Aspen (sist revidert 21.02.2022, sitert 10.01.2024). Tilgjengelig fra: Version 7 (legemiddelsok.no); b: Labetalol S.A.L.F. (sist revidert 04.01.2022, sitert 10.01.2024). Tilgjengelig fra: 15-10881.pdf (legemiddelsok.no). Norsk legemiddelstandard, Direktoratet for medisinske produkter, Nasjonale veiledninger, legemidler etter anbrudd, veiledende brukstider for legemidler med krav til sterilitet, (2024.0, publisert 20.09.2023, sitert 09.01.2024). Tilgjengelig fra: Legemidler med krav om sterilitet - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no) Prosedyre I.4.13.1.5--2 «Preeklampsi/hypertensive svangerskapskomplikasjoner SSHF», Fellesprosedyrer Obstetrikk, EK-web (versjon 21.01 av 15.11.2022, sitert 09.01.2024), avsnitt «antihypertensiva». Tilgjengelig fra: https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok09777.pdf Injectable medicines administration guide (bok), University College London Hospitales, NSH, 3. ed. Monografi "Labetalol hydrochloride", s. 217. Norsk Legemiddelhandboka, kapittel G8, legemidler og amming, tabell legemidler A-Å, rubrikk "labetalol" (sitert 09.01.2024). Tilgjengelig fra: G8.1.12 L Legemiddelhandboka (legemiddelhandboka.no) 				
Utarbeidet av farmasøyt L.Vesterhus, Sykehusapoteket Kristiansand			Dato: 10.01.2024 (versjon 2.0) side 1 av 1	