

B02AA02	<p style="text-align: center;">TRANEKSAMSYRE</p> <p style="text-align: center;">Cyklokapron® (Pfizer); Pilexam® (Pilum Pharma); Tranexamic acid (Stragen)</p>			<p style="text-align: center;">Blandekort Voksne Føde/Barsel SSHF</p>
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
100 mg/ml Injeksjons- /infusjonsvæske, oppløsning, ampuller	Kan gis ufortynnet ⁴ eller fortynnet ⁴ med et passende volum NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml	<u>IV injeksjon^{1,4}:</u> <u>Ufortynnet løsning:</u> Gis langsomt, maksimalt 1 ml pr. minutt	<u>Ampulle²:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning²:</u> Høyst 12 timer i RT	AMMING ⁵ : Lav overgang til morsmelk, forenlig med amming. VANLIGE BIVIRKNINGER ¹ : Diare, oppkast, kvalme.
Konsentrasjon: 100 mg/ml		<u>IV infusjon</u> <u>Fortynnet løsning⁴:</u> Maksimal hastighet 100 mg pr. minutt		
<p>Tilleggsopplysninger:</p> <p>Dosering^{1,3,4}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 mg (2 amp a' 5 ml) gis langsomt, enten som IV injeksjon eller som IV infusjon. <u>Skal ikke gis IM.</u> - IV injeksjon: Maksimalt 1 ml pr minutt. - IV infusjon: Over minimum 10 minutter: 1000 mg traneksamsyre i 100 ml NaCl 9 mg/ml. - Kan gientas etter 30 minutter (IV injeksjon/infusjon). <p>Forkortelse: NaCl = Natriumklorid. IM = Intramuskulær. IV = Intravenøs. RT = romtemperatur (15-25°C).</p> <p>Referanseliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statens legemiddelverk, norsk preparatomtale (SPC), Cyklokapron Pfizer, (sist revidert 29.03.2019; sitert 23.01.2023). Tilgjengelig fra: Quality Review of Documents human product information template version 8 highlighted (legemiddelsok.no). Norsk preparatomtale (SPC), Tranexamic acid Stragen (sist revidert 06.12.2019; sitert 23.01.2023). Tilgjengelig fra: Hreferralspcen (legemiddelsok.no) 2. Statens legemiddelverk, Norsk legemiddelstandard, kap. 6, Oppbevaring og merking, veiledende maksimale brukstider for sterile legemidler etter anbrudd, 2023.0 (oppdatert 01.01.2023, sitert 13.01.2023). Tilgjengelig fra: Veiledende maksimale brukstider for legemidler etter anbrudd - Legemiddelverket 3. Prosedyre I.4.13.1.2-15, Postpartum blødning. Føde/Barsel SSHF (PPB), Fellesprosedyrer Obstetrik/Fødsel SSHF, EK-web (versjon 24.01 av 15.11.2022; sitert 23.01.2023), avsnitt «Behandling av atoni (60 – 80 %)», punkt om traneksamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®.). Tilgjengelig fra: https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok21791.pdf 4. Injectable medicines administration guide (bok), University College London Hospital, NSH, 3. ed. Monografi for "Tranexamic acid", s. 320. 5. Database Janusinfo, beslutningsstøtte "Janusmed amning", monografi "Tranexamsyra" (sist oppdatert 08.11.2022, sitert 23.01.2023). Tilgjengelig fra: Amning Janusmed 				
Utarbeidet av farmasøyt L. Vesterhus, Sykehusapoteket Kristiansand			Dato: 23.01.2023 (versjon 2.0) side 1 av 1	

