

BLØDKULTUR - VOKSEN

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.f-2

Gruppe:

COVID-19

Godkjent dato:

18.06.2024

Gyldig til:

18.06.2026

Revisjon:

0.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/COVID-19

- 2 stikk og 2 sett (ett sett= 2 flasker, 1 aerob og 1 anaerob). Aerob (blå) tas først, deretter anaerob (orange)
- 10 ml pr flaske. Sett strek på flaskene før prøvetaking
- I motsetning til vanlige rør, må blodkultur holdes inn på nåla under hele prøvetakingen. Anbefaler å bruke butterfly, ikke vanlig nål
- Flaskene må merkes slik at flasker fra samme venepunksjon hører sammen (I = første sett, II = andre sett)
- Etter palpasjon og lokalisering av en velegnet vene desinfiseres prøvetakingsstedet med klorheksidinsprit 5 mg/ml.
- Vask i spiral ut fra sentrum til en diameter på 5 – 6 cm. Virketid 30 sek, lufttørkes.
- Ikke ta på området etterpå
- Plastlokket på toppen av flasken fjernes og gummikorken vaskes x1 med desinfeksjonsmiddel (alcoswab må ikke brukes). La lufttørke i minst 30 sek. Lokket er kun en garanti for at flaska ikke har vært brukt. Bruk derfor **aldri** flasker hvor lokket er fjernet.
- Skru nålen i holderen og stikk på tørt sted. **Unngå** palpasjon av innstikkstedet med **steril** finger eller hanske
- Fyll flaskene med 8-10 ml blod. Aerobe flasker fylles først, deretter anaerobe. Det er angitt 5 ml streker på flaskenes etikett. Vakuemet tillater at en fyller mer enn 10 ml. Følg derfor **nøy** med på volumet.
- Andre blodprøver tas etter blodkulturene.

Utarbeidet av:

Fagspl. Siv Aanestad

Først utgitt:

03.04.2020

Fagansvarlig:

Fagspl. Siv Aanestad

Godkjent av:

[]