

Endoftalmitt-injeksjon av antibiotika

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.SOA.ØYE.2.8.1-23

Godkjent dato:

25.04.2023

Revideres innen:

25.04.2025

Sist endret:

25.04.2023

Revisjon:

1.01

Klinikknivå\Somatikk Arendal\Øyeavdelingen\Metodebok Øye\Sykepleieprosedyrer

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 25.04.2025

Indikasjon: Alvorlig bakteriell infeksjon i øyet**Pre-opr på forrommet:**

Dryppe pasienten med OT (oxibuprocaine, tetracaine)

Dersom narkose-drypp etter at pas har sovnet. Ta på litt salve i det øyet som ikke skal opereres og tape igjen.

Husk: Sett på mikroskopet og still inn etter lege**Medikamenter:**

-Vancomycin og Ceftacidin (bland antibiotika etter oppskrift på eget ark)

Huddesinfeksjon:

-Jod dryppes i øyet og vask godt rundt øyet. Det skal også dryppes en dråpe jod i pasientens øye hver gang før antibiotikaen settes.

Utstyr:

Frakker og hansker

Bordtrekk

Mikroskopknotter

Alcon hulllaken med drape

Øyelokksperre

1 tetracain minims

Saks

Manikniv

Moorfield pinsett

Kaliper-mål

1 liten BSS

1pk tørkespyd

2stk opptrekkskanyler (til å trekke antibiotika ut av posen)

2stk 1ml sprøyte (til inj av antibiotika)

2 stk kanyle 30G, gul spiss (til inj av antibiotika)

1 stk 2ml sprøyte (kanskje hydrere snitt i kornea)

1 stk kanyle 27G, butt grå (kanskje hydrere snitt i kornea)

Kloramfenikol salve

1 pk små kompresser (til bandasje under eyepad)

1 eyepad

Fremgangsmåte:

Legge på laken med drape. Klipp opp drape. Sett på plass øyelokksperre. Mål opp med caliper. Dryppe dråpe jod. Settes inj nr 1. Paracentese med manikniv og avklipt spyd. Måle på nytt med caliperinstrument. Sette inj nr 2. (evt tette snitt med BSS).

Utarbeidet av:
ReidunFagansvarlig:
Hanne Berg Gilbo

Verifisert av:

Godkjent av:
Hanne Berg GilboDok.nr:
D51247