

		Klinikknivå			Prosedyre
Charlazon					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.SOA.ØYE.2.8.1-33		Godkjent dato: 22.08.2024	Revideres innen: 22.08.2026	Sist endret: 22.08.2024	Revisjon: 3.00

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Indikasjon:

Chalazion er en kul i øyelokket som er avgrenset i kronisk betennelse i kjertler (Meibomske kjertler) i øyelokkets tarsalplate. Kjertlene ligger langs øyelokkets bakside og munner ut på øyelokkskanten. Hvis ikke behandling med øyesalve fører frem og forandringen forsvinner spontant, er utskrapning av kulens innhold nødvendig

Preoperativt:

Øyedråper: Oxibuprocain og Tetracain.

Fremgangsmåte:

Utførelse: Øyelokket vrenses, det legges et snitt og innholdet skrapes ut. Såret gror fra bunnen av. Hvis kulen må tømmes fra utsiden, settes ofte en sutur i huden ved avslutning.

Anestesi: Xylocain/Adrenalin 10 mg/ml + 5 mcg/ml

Instrumenter:

Chalazion-skrin

Utstyr:

Frakker
 Hansker
 Bordpose
 Liten hullduk
 2 ml sprøyte
 30 G, gul kanyle
 Små kompresser
 Tørke pinner
 Knivblad nr.15
 Eye- pad
 Tape

Desinfeksjon:

Klorhexidin 0.5 mg/ml.

Suturer:

Hudsutur: Optilene 6-0.

Bandasje:

Kloramfenikol salve, små kompresser i en trekant og eye- pad.

Post opr. Info: vurdere varme og massasje.

Utarbeidet av: Christine Aanstad Kolaas	Fagansvarlig: Kari-Anne Bosvik	Verifisert av: []	Godkjent av: Espen Ringvold	Dok.nr: D51348
---	--	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------

Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.8.1-33	Utarbeidet av: Christine Aanstad Kolaas	Fagansvarlig: Kari-Anne Bosvik	Godkjent dato: 22.08.2024	Godkjent av: Espen Ringvold	Revisjon: 3.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer