

**Epiduralanestesi Peri/Postoperativt Anestisirutine SSF, SSF**

Side 1 av 1

 Dokumentplassering:  
**II.SOF.KIF.SSF.7-16**

 Godkjent dato:  
**12.07.2023**

 Revideres innen:  
**12.07.2025**

 Sist endret:  
**12.07.2023**

 Revisjon:  
**2.00**

 Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Intensiv - SSF/Administrative rutiner  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Fra 17.09.20 følger SSF prosedyre for Epiduralanestesi fra SSA med to unntak.

1. For SSF gjelder ikke blandingsalternativet Sufenta – Marcain – Adrenalin.  
Det brukes kun Standard EDA-blanding (Breivik-blanding).
2. Ved behov kontaktes vakthavende Anestesisykepleier på tel. 7390

Link til gjeldende prosedyre:

<http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok49974.pdf>
**Kryssreferanser**
**Eksterne referanser**

Utarbeidet av: Vidar Skogstrøm, Marius Holen, Kay Cora Kræft	Fagansvarlig: Cristian Stremme	Verifisert av: []	Godkjent av: Mariann Taxerås	Dok.nr: D51520
--	-----------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------