

Arbeidsoppgaver på pasientrommet- øye operasjon

Side 1 av 3

Dokumentplassering: II.SOA.ØYE.2.8.1-35	Godkjent dato: 31.01.2023	Revideres innen: 31.01.2025	Sist endret: 31.01.2023	Revisjon: 1.02
---	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Klinikknivå\Somatikk Arendal\Øyeavdelingen\Metodebok Øye\Sykepleieprosedyrer

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 31.01.2025 uten endringer i dokumentet.

Indikasjon:

Pre og post operativ sykepleie til ulike operasjoner. Dette innebærer informasjon, premedisinering etc.

Preoperativt:

- Kontrollere ID, hvilket øye.
- Registrer pasienten inn på DIPS.
- Kontroller at pasienten har dryppet med dråper i tre dager før operasjon og samme dag.
- Informere om de ulike dråpene de får pre operativt, fungerer som lokalbedøvelse, infeksjonsforebyggende og pupille dilaterende. Dryppes i to runder. Avslutter med Tetracain rett før pasienten går til laser.
- Gi Vival 5 mg.
- Ved toriske linser, sjekk at samtykkeskjema er undertegnet. De må betale mer for denne linsen.
- Gi informasjon om operasjonen
 - Informer om laserbehandling (Ligge flatt, kort varighet, kopp på øyet).
 - Ligge stille på operasjonsbordet.
 - Se på lyset fra mikroskopet. Fokusere rett frem på punktene i lyset.
 - Lengden på operasjonen.
 - At det dekkes til over ansiktet (får godt med luft innunder).
 - Gi informasjon om at de må ligge flatt under operasjonen.
 - Spør om eventuelle behov i forhold til leiringen.
 - Minus høreapparat på aktuell side.

Dråper:

- Cyclopentolate 1%
- Metaoxidrin 10%
- Tropicamid 0,5%
- Oxybucaïn 0,4%
- Voltaren 1 mg/ml
- Tetracain 1%

Utarbeidet av: Christine Aa. Kolaas	Fagansvarlig: Ranja G. Evensen	Verifisert av: []	Godkjent av: Hanne Berg Gilbo	Dok.nr: D51977
--	-----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------

Postoperativt

- Får med seg informasjonsbrev med kontrolltiden. Se til at informasjonen i skrivet er forstått. For eksempel;
 - Kontrolltime
 - Informasjon om time for andre øye.
 - Dråper
 - Eventuelt finne frem og informere om ekstra dråper/tabletter--- ved behov.
- Leve som normalt etter operasjonen, men;
 - Ikke gni seg i øyet
 - Ikke vann i øyet, dusje fra halsen og ned. Minus klorvann. Ikke bade i basseng på to uker.
 - Øyeskjold om natten første uka.
 - Ikke trene/ tungt fysisk arbeid, første uka.
 - Solbriller på grunn av økt lysskyhet
 - Ikke bilkjøring før første kontrolltime.
- Normale plager etter operasjon er;
 - Ruskfølelse og ubehag, kan vare i flere måneder
 - Uklart syn, men klarer gradvis opp etter operasjonen.
 - Det kan ta noe tid før pupillen trekker seg sammen til normal størrelse.
 - Rødt på det «hvite» på øyet etter laserbehandlingen.
- Fare symptomer
 - Økende smerte
 - Forverret syn
 - Forverring av rødt øye
 - Ta kontakt ved problemer.

- Registrer pasienten ut på DIPS

Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.8.1-35	Utarbeidet av: Christine Aa. Kolaas	Fagansvarlig: Ranja G. Evensen	Godkjent dato: 31.01.2023	Godkjent av: Hanne Berg Gilbo	Revisjon: 1.02
-------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------

Klinikknivå\Somatikk Arendal\Øyeavdelingen\Metodebok Øye\Sykepleieprosedyrer

Kryssreferanser

Eksterne referanser