

		Klinikknivå			Prosedyre
5FU					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.SOA.ØYE.2.8.2-20		Godkjent dato: 02.06.2023	Revideres innen: 02.06.2025	Sist endret: 02.06.2023	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Formål

Åpne drenasje ved tett pute etter trabekulektomi.

Forbehandling

Det aktuelle øyet dryppes med Oxibuprokain 4 mg/ml Og Tetrakain 10 mg/ml.

Utstyr

- Fluorouracil 50 mg/ml (5FU)
- NaCl 9 mg/ml
- Sprøyte 1 ml
- Opptrekkskanyle 19G
- Gul kanyle til injeksjon 30G
- Desmarres hake
- Anatomisk pinsett
- Cellestoff eller annet til tørk
- Hansker

Fremgangsmåte

- Bruk hansker under opptrekk og injeksjon
- Trekk opp 0,1 ml 5FU (0,2-0,3 ml i sprøyten)
- Lege setter injeksjon
- Skyll øyet godt med NaCl 9mg/ml etter injeksjonen

Kode

TCF00

Utarbeidet av: Ann Karin Bjurstrøm	Fagansvarlig: Espen Ringvold	Verifisert av: []	Godkjent av: Espen Ringvold	Dok.nr: D52663
----------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------------

Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.8.2-20	Utarbeidet av: Ann Karin Bjurstrøm	Fagansvarlig: Espen Ringvold	Godkjent dato: 02.06.2023	Godkjent av: Espen Ringvold	Revisjon: 2.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer