

		Klinikknivå			Prosedyre
Mitomycin håndtering øye operasjon					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOA.ØYE.2.8.1-41		Godkjent dato: 25.04.2023	Gyldig til: 25.04.2025	Sist endret: 25.04.2023	Revisjon: 1.01

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 25.04.2025

Mitomycin er en cellegift og brukes ved filtrerende kirurgi øye, for eksempel trab og preserflo. Kan også brukes ved revisjoner av trab eller preserflo. Mitomycin er sterkt vevstoksisk medikament og kan gi hud skade. Det skylles derfor rikelig med vann etter kontakt med slimhinne.

Koordinerende operasjonssykepleier bruker hansker ved håndtering av mitomycin under operasjon. Hanskene kastes i gul boks.

Instrumenter som har vært i kontakt med mitomycin byttes ut med nye.

Håndtering av avfall: operasjons duk, bordpose, hansker samt alt som har vært i kontakt med mitomycin kastes i gul boks.

OBS! Gravide skal ikke administrere cytostatika.


Mitomycin levers ferdig blandet fra apoteket. Sykepleier på pasientrom har ansvar for bestillingen.

Kryssreferanser

<http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok13893.pdf>

Eksterne referanser

<https://www.felleskatalogen.no/>

Utarbeidet av: Christine Aa.Kolaas	Fagansvarlig: Ranja G.Evensen	Verifisert av: 	Godkjent av: Hanne Berg Gilbo	Dok.nr: D52791
--	---	---	---	--------------------------