

 SØRLANDET SYKEHUS				Klinikknivå		Prosedyre	
Gastroskopi, Avdeling for pleie og poliklinikk, SSA						Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.6-12			Godkjent dato: 06.06.2025		Revideres innen: 06.06.2027	Sist endret: 06.06.2025	Revisjon: 9.01

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 06.06.2027

Forberedelse

- Faste 6 timer før undersøkelsen
- Eventuelt seponere Marevan . INR-svar må foreligge. Vurder behov for seponering av andre antikoagulantia ihht eget skjema
- Eventuelt endocardittprofylakse

Forberedelse på gastrolab

- Pasienten informeres
- Xylocainspray i svelget
- Veneflon dersom eventuell sedering

Oppdekking til undersøkelse

- Gastroskopi med tilhørende ventiler og koplinger
- Munnstykke
- Xylocain spray
- Spyleflaske med vannslangesett
- Sugslange + pose
- Hansker
- Vaskebakk med klut
- Evt. 20 ml sprøyte med "minifom vann"

Biopsitaking

- Biopsitang
- Sprøytespiss
- Kompress
- Biopsiene tas på NaCl, formalin, urease, eller portagerm

Etter undersøkelsen

Vent 1 time med å spise eller drikke (pga bedøvelse i svelget)

Rengjøring av gastroskop med tilbehør. Følg nasjonale retningslinjer for vask av skop.

1. Sug gjennom rikelig med vann/enzymsepe (4dl)
2. Sett på blå ventil for sug og blås, og sug igjennom med vann. (Olympus skop)
3. Slå av rec., kast alle engangsventiler
4. Vask skopet utvendig med klut og såpe

Se egen prosedyre, skyllerom

NB! lekkasje test – sjekkes før skopet settes i vaskemaskinen

Sklerosering ved blødning

Utarbeidet av: Siri Lindgren	Fagansvarlig: Johan Holck-Steen	Verifisert av: 	Godkjent av: Nina Roland	Dok.nr: D00749
--	---	---	------------------------------------	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		Gastroskopi, Avdeling for pleie og poliklinikk, SSA			Side: 2
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.6 -12		Utarbeidet av: Siri Lindgren	Fagansvarlig: Johan Holck-Steen	Godkjent dato: 06.06.2025	Godkjent av: Nina Roland
					Revisjon: 9.01

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

Alternativ 1: Katastrofeadrenalin

Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml – 5 ml trekkes opp og blandes i 100 ml NaCl 9mg/ml
Engangsnål for injisering

Alternativ 2: Histoacryl

Se prosedyre: Histoacrylbehandling ved fundus og blødende øsofagusvaricer (lenke under)

Alternativ 3: Clips

Alternativ 4: Strikkbehandling av øsofagusvaricer

Alternativ 5: Gullprobe

Alternativ 6: APC

Kryssreferanser

<https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok00057.pdf>

Eksterne referanser