

 SØRLANDET SYKEHUS	Somatikk Arendal	Prosedyre
Forberedelse av inneliggende pasienter til coronar angiografi/PCI"		Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2-5	Godkjent dato: 13.05.2025	Gyldig til: 13.05.2027
		Revisjon: 10.00

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

FORBEREDELSE:

- Pasienten kan spise en lett frokost
- Pasienten skal ha rosa eller grønn PVK med 3-veis kran, på venstre hånd (høyre hånd hvis tidligere ACB-operert).
- Pasienten skal ha ekstra PVK ved pågående infusjoner. tillegg.
- Gi beskjed hvis pasienten har behov for tolk
- Pasienten fra annet sykehus skal ankomme SSA så tidlig som mulig.
- Ved allergi mot kontrast/tidligere allergiske reaksjoner, skal pasienten ha premedikasjon etter prosedyre.
- Dagens EKG skal være tatt
- Ecco cor skal være tatt
- Pasienten skal ha korrekt og tydelig ID merket på armbånd rundt handledd.

LABORATORIEPRØVER:

- Pasienter som bruker Marevan må ta INR kvelden før. INR bør ideelt være < 2,0 undersøkelsesdagen, men hos pasienter med mekanisk klaffepoteser bør INR ideelt være mellom 2-2,5.
- Kreatinin, elektrolytter og Hgb. svar skal ikke være eldre enn 2 dager.
- Pas skal ha oppsvæsking ved nyresvikt

PAPIRER SOM SKAL VÆRE MED:

- Relevante 12-avl EKG + dagens EKG
- Sjekkliste som er fullstendig utfylt.
- Medisinsk kurve, ajourført. Det må komme klart fram hvilke medisiner som er gitt.

MÅ FORELIGGE I DIPS:

- Aktuelt journal notat.
- Operasjonsbeskrivelse av tidligere ACB-opererte og kat.rapport ved tidligere PCI.
- Lab.svar
- Røntgen thorax beskrivelse
- Epikrise + lab.ark skannes når pasienten kommer fra STHF

Utarbeidet av: Angela Martinez-Pettersen/Tonje Altenborg	Fagansvarlig: Thomas Dahlslett/Karen Margrethe Krogsrud	Godkjent av: Nina Roland	
--	---	------------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Forberedelse av inneliggende pasienter til coronar angiografi/PCI"				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2-5	Utarbeidet av: Angela Martinez-Pettersen/Tonje Altenborg	Fagansvarlig: Thomas Dahlslett/Karen Margrethe Krogsrud	Godkjent dato: 13.05.2025	Godkjent av: Nina Roland	Revisjon: 10.00

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

MEDIKAMENTER:

- Alle pasienter skal som hovedregel ha Albyl E før koronar angiografi. Platehemmer startes opp ved PCI, etter guidelines. Hvis kontraindikasjon for Albyl E og/eller ta kontakt med ansvarlig lege.
- Fragmin/Klexane/Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana skal ikke gis/tas undersøkelsesdagen.
- Glukophage / Metformin nulles 2 (1) dager før, hvis mulig.

Kryssreferanser

Eksterne referanser