

**Behandling med Integrilin (eptfibatid) PCI-senteret, SSA**

Side 1 av 2

Dokument ID:

**II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-12**

Godkjent dato:

**24.02.2023**

Gyldig til:

**24.02.2025**

Revisjon:

**5.05**

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

**Indikasjon**

Tilleggsbehandling til heparin og ASA ved ustabil angina pectoris og non-Q-infarkt hos høyrisikopasienter. Planlagt intervensjon (PCI) på høyrisikopasienter, og ved STEMI.

**Absolutte kontraindikasjoner**

Aktive blødninger eller kjent blødningstilstand  
Apopleksi siste 3 måneder om blødning ikke er utelukket ved CT  
Hypertensjon (>200/110)  
Aortadisseksjon  
Trombocytall under 100  
Nyresvikt/leversvikt  
Allergi ovenfor innholdstoffene

**Injeksjonsvæske**

2 mg/ml i 10 ml hetteglass

**Infusjonsvæske**

0,75 mg/ml i 100 ml flaske

**Dosering**

- 1) 180 µg/kg settes som i.v. bolus i løpet av 1-2 minutter. Se tabell
- 2) Deretter 2 µg/kg/min som kontinuerlig infusjon i inntil 72 timer. Gis oftest på PCI-lab. Protokoll på Volumpumpe.
- 3) Etter PCI avsluttes infusjonen etter legens forordning.
- 4) Dersom pasienten skal opereres som ø.hjelp skal infusjonen avbrytes straks.
- 5) Trombocyttenes funksjoner er normalisert 4 timer etter seponering.

Pasienten som kommer med infusjon fra henvisende sykehus; i så fall gjelder punkt 2) til 4).

**Trombocytter og Hb** kontrolleres etter ca. 4 timer og påfølgende dag, samt daglig så lenge infusjonen pågår.

NB! Sjekk blodprøvesvarene.

**Holdbarhet**

Integrilin – holdbar i 24 timer i kjøleskap etter anbrudd.

Holdbar i 12 timer i romtemp. Etter anbrudd.

Se tabell neste side!

Utarbeidet av:


**Inger Johanne Gilberg/Inger  
Marie Nasset**

Fagansvarlig:

**Slobodan Calic**

Godkjent av:

**Ole Høie**

		<b>Behandling med Integrilin (eptfibatid) PCI-senteret, SSA</b>			<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2. 1-12	Utarbeidet av: Inger Johanne Gilberg/Inger Marie Nesset	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Godkjent dato: 24.02.2023	Godkjent av: Ole Høie	Revisjon: 5.05

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

### Behandling med Integrilin (Eptfibadid)

**Bolus-dose: 180 µg/kg, bolusdosen gis i løpet av 1-2 minutter.**

**Integrilin, injeksjonsvæske: 2 mg/ml**

Vekt, kg	µg/bolusdose	Bolusdose/ml
40	7200	3,6
45	8100	4,1
50	9000	4,5
55	9900	5,0
60	10800	5,4
65	11700	5,9
70	12600	6,3
75	13500	6,8
80	14400	7,2
85	15300	7,7
90	16200	8,1
95	17100	8,6
100	18000	9,0
105	18900	9,5
110	19800	9,9
115	20700	10,4
120	21600	10,8

**Vedlikeholdsdose 2 µg/kg/minutt**

**Integrilin, infusjonsvæske, 0,75 mg/ml**

Vekt, kg	µg/time	ml/time
40	4800	6,4
45	5400	7,2
50	6000	8
55	6600	8,8
60	7200	9,6
65	7800	10,4
70	8400	11,2
75	9000	12
80	9600	12,8
85	10200	13,6
90	10800	14,4
95	11400	15,2
100	12000	16
105	12600	16,8
110	13200	17,6
115	13800	18,4
120	14400	19,2

Utarbeidet av: <b>Inger Johanne Gilberg/Inger  Marie Nesset</b>	Fagansvarlig: <b>Slobodan Calic</b>	Godkjent av: <b>Ole Høie</b>	
--	--	---------------------------------	--