

**MUNNBIND OG ØYENBESKYTTELSE - OPERASJON - SSA**

Side 1 av 2

Dokument ID:

**II.SOA.AIO.OPA.2.8-11**

Godkjent dato:

**07.01.2025**

Gyldig til:

**07.01.2027**

Revisjon:

**8.03**

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasientbehandling /Smittevern

## HENSIKT

- Beskytte pasienten og personalet mot smitte.
- Beskytte sterilt utstyr ved aseptiske prosedyrer.

## OMFANG

### Munnbind

- Alt personell som oppholder seg på operasjonsstuen under pågående operasjon og under forberedelse til operasjon f.o.m. det tidspunkt sterilt utstyr blir avdekket.
- Alt personell i arbeid med pasient med påvist eller mistanke om MRSA.
- Alt personell i kontakt med pasienter med dråpesmitte eller luftsmitte.
- Oppgaver som involverer risiko for sprut av biologisk materiale
- Smitterisikoen ved luftveisinfeksjoner øker med økt kontakttid og uttalte luftveissymptomer. Helsepersonell bør derfor vurdere bruk av åndedrettsvern ved langvarig kontakt (mer enn 15 min) når pasienten har uttalte symptomer og ved aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene.
- Se retningslinje: [Pasienter med smitte - Operasjon - SSA](#)

### Øyenbeskyttelse

- Alt personell, ved fare for sprut av biologisk materiale.

## ANSVAR

Avdelingsledelsen har ansvar for å legge til rette for bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Den enkelte bruker har ansvar for riktig bruk til rett tid.

## TILTAK

### Munnbind

- Sett på munnbind over munn og nese, slik at det er minst mulig luftlekkasje, båndene knyttes på hodet og i nakken. Luften skal filtreres **gjennom** masken.
- Bytt munnbind etter gjennomføring av oppgaver med risiko for sprut og ved behov.

### **Etter bruk:**

- Ta tak i båndet og fjern munnbindet.
- Kastes i restavfall.
- Vask deretter hendene grundig eller utfør hånddesinfeksjon.
- Ikke gå med munnbind rundt halsen.

### Briller/visir

- Brukes ved fare for sprut av biologisk materiale og til beskyttelse ved høyinfeksiøs alvorlig luftsmitte.
- Ved fare for alvorlig luftsmitte brukes tettsittende beskyttelsesbriller.
- Ved nærkontakt med barn med RS-virusinfeksjon.
- Ved prosedyrer som fører til aerosoldannelse.
- Man bør være oppmerksom på at visse infeksjoner som spres ved dråpekontakt, også kan overføres via øyeslimhinnen. (Ebola, viral hemorragisk feber m.fl.)

### *Kryssreferanse:*

[Munnbind og øyebeskyttelse - SSHF](#)

Utarbeidet av:

**Sp.spl. Olga Harnes**

Fagansvarlig:

**Fagutv.spl Kristina Løvslund  
Huset**

Godkjent av:

**Janne Jettestad**

 SØRLANDET SYKEHU	<b>Munnbind og øyenbeskyttelse - Operasjon - SSA</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOA.AIO.OPA.2.8-11	Utarbeidet av: Sp.spl. Olga Harnes	Fagansvarlig: Fagutv.spl Kristina Løvslund Huset	Godkjent dato: 07.01.2025	Godkjent av: Janne Jettestad	Revisjon: 8.03

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasientbehandling /Smittevern

***Eksterne referanser:***

[\*\*\*Infeksjonskontroll - Bruk av munnbind - Medisinske ansiktsmasker\*\*\*](#)

[\*\*\*Infeksjonskontroll - Vernebriller og visir- og øyevern\*\*\*](#)

[\*\*\*Basale smittevernrutiner - FHI\*\*\*](#)