

LEVERBIOPSI

Leverbiopsi betyr at det blir tatt ut en liten vevsbit av leveren som sendes til undersøkelse.

Forberedelse

Du må ikke spise de siste 8 timer, men du kan drikke vann inntil en time før undersøkelsen.

Bruker du blodfortynnende medisiner som gir økt blødningsrisiko, må dosen justeres eller sløyfes før prøvetakingen. Dette avklares med legen på avdelingen.

Prøvetakingen

Det er legene på gastrolab som tar vevsprøven (biopsien). Du vil bli tatt imot av sykepleier som informerer deg om undersøkelsen. Det skal tas blodtrykk før og etter prosedyren, men det blir som regel tatt på avdelingen.

Leveren blir først undersøkt med ultralyd. Deretter får du lokalbedøvelse i huden og videre inn til leverkapselen. Vevsprøven tas ut ved hjelp av en tynn nål. Dette er fort gjort, og det medfører sjelden (noe) ubehag eller smerte. I noen tilfeller tas det flere prøver.

Etter prøvetakingen

Den første timen etter prøvetakingen må du ligge i ro, og heller ikke spise eller drikke. Vi kan aldri helt utelukke at det kan oppstå problemer som blødning eller smerter. Det er ikke uvanlig at man kan få smerter i høyre skulder i forbindelse med biopsien, men det gir seg oftest i løpet av den første timen. Hvis du i etterkant ikke føler deg bra, må du si fra til personalet.

Prøven sendes til laboratoriet. Når prøvesvar foreligger, vil du få beskjed av lege.

trygghet når du trenger det mest