

Innleggelse av tunnelt dialysekateter med cuff, Med.avd. SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.DL-1

Godkjent dato:

16.01.2024

Gyldig til:

16.01.2026

Revisjon:

10.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

HENSIKT

Anlegge et godt fungerende kateter til permanent bruk i hemodialysebehandling. Unngå blødning.

OMFANG

Gjelder for pasienter i langtids hemodialysebehandling.

STED

Operasjonsavdelingen.

HANDLING

- Barber huden fra hals og ned til og med brystvorten ved mye behåring hos menn.
 - Faste fra kl 24 kvelden før. Pasienten kan evt. drikke klare væsker inntil 2 timer før operasjonen.
 - Pas skal dusje, ha ren seng og rent tøy operasjonsdagen
 - Pasienten må evt. tømme blæra.
 - Gi evt. Premedikasjon, hør med lege som tar imot pasienten
1. Dialysekateteret sendes med pasienten.
 2. Rtg. thorax skal alltid tas etter innleggelse av dialysekateter med tanke på kateterposisjon og for å utelukke pneumothorax. Kontrolleres av nefrolog. Kateteret må ikke tas i bruk før rtg.thorax er tatt og vurdert av lege.
 3. Pasienten er ofte innlagt et døgn til observasjon etter kateterinnleggelsen grunnet blødningsfare. Observere regelmessig for blødninger ved å sjekke bandasjen over kateteret. Ved blødning: observer bandasjen hyppig for å vurdere om blødningen øker, ev legge på sandsekk og kontakte vakthavende lege.
 4. Suturere som ligger 5-10 cm over dialysekateteret kan fjernes etter 7-10 dager. (Noen ganger brukes suturer som forsvinner av seg selv). Suturere rundt dialysekateteret kan fjernes etter ca 3-4 uker og det kateteret festes med «Stat-lock»