

		PASIENTER OG BRUKERE		Prosedyre
SECTIO - GRAD I SSK				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.a-7	Gruppe: □	Godkjent dato: 14.05.2024	Gyldig til: 14.05.2025	Revisjon: 1.35

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

DEFINISJONER

Akutt sectio defineres som en situasjon hvor barnet eller moren er i livsfare.

Teamet består av anestesisykepleier, operasjonssykepleier, anestesilege, gynekolog, pediater og laboratoriet.

Varsling skjer ved gruppeoppkall. Displayet viser «Sectio I»

BESKRIVELSE

- Stue 9 skal til enhver tid være klargjort for akutt sectio. Dersom stue 9 er opptatt brukes nærmeste stue etter avtale.
- Ha alt utstyr klargjort og kontrollert:
 - anestesiapparat: - komplett med monitoreringsutstyr
 - skråpute/bruk bordet - For å bygge opp god sniffing position
 - intubasjonsutstyr: - CMAC med mandreng, 1.valg (på lager rett over gangen for stue 9)
 - kort laryngoscopskaft med blad nr 3 og 4
 - tube nr. 7,0
 - mandreng
 - medikamentene ligger ferdig opptrukket i pussbekken i kjøleskapet på med. rommet. innholdsfortegnelse henger på veggen på med.rommet.
- Ta med medikamenter, CMAC og gå straks til aktuelle stue.
- Pasient tiltak:
 - Pasienten drikker 30ml syrenøytraliserende middel, Natriumcitrat mix 0,3 mmol/ml
 - Pasienten bør ha minimum 2 velfungerende grønne pvk
 - Cefazolin 2g i.v. gis umiddelbart, ved allergi gis Klindamycin (Dalacin) 600mg
 - Tipp bord mot pasientens venstre side for å unngå vena cava syndrom
 - Antitrendélenburg-leie
 - Preoxygenere i 3 min
 - Pentothal 250-500 mg iv
 - Vurder cricoidtrykk
 - Curacit 100 mg iv
 - Intubasjon med videolaryngoskop er førstevalg
 - Sevoflurane, evt med lystgass
 - Etter barnet er forløst; vanlig G.A.
 - Oxytocin 3 I.E. i.v. etter forespørsel fra gynekolog

Dersom Oxytocindrypp ordineres, er standard blandingsforhold 50 IE Oxytocin i 500 ml NaCl 0,9%, hastighet 150 ml/time.

(TIPS: I akutte situasjoner for raskere administrering: 10 IE Oxytocin i 100ml NaCl 0,9%)

Referanser

[II.SOK.KKK.FBK.2.2-3 Sectio. Føde/Barsel SSK](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-8 Sectio - Grad 2 SSK](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-9 SECTIO - GRAD 3 SSK](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-20 Prostinfenem - medikamentell behandling av postpartum blødning](#)

[I.4.8.1.2-15 Postpartum blødning. Føde/Barsel SSHF \(PPB\)](#)

Utarbeidet av: Kirsti Menning, Sindre Ose	Først utgitt: 17.02.2007	Fagansvarlig: Stefan Hyler	Godkjent av: Grete Kruger Erdvik	□
---	------------------------------------	--------------------------------------	--	---