

		PASIENTER OG BRUKERE		Prosedyre
SECTIO - GRAD 3 SSK				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.a-9	Gruppe: □	Godkjent dato: 17.06.2024	Gyldig til: 17.06.2025	Revisjon: 1.27

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

DEFINISJON

Prosedyren gjelder sectio hvor forløsning kan vente **utover 20 minutter, men ikke til neste dag.**

ANSVAR

Teamet består av følgende: gynekolog, anestesilege, pediater, anestesisykepleier, operasjonssykepleier og laboratoriet

BESKRIVELSE

1. Gynekolog beslutter at sectio med forløsning utover 20 minutter skal iverksettes.
2. Gynekolog varsler jordmor og anestesilege tlf. 8555.
3. Jordmor varsler pediater, operasjonssykepleier og klinisk kjemisk lab.
4. Operasjonssykepleier varsler anestesisykepleier tlf. 6878.
5. Anestesi peroperativt, se prosedyre Sectio Grad 2 SSK
6. Cefazolin 2 g iv gis på operasjonsstuen og tilstrebes infundert 15 til 30 minutter før operasjonsstart.
Ved allergi gis Klindamycin (Dalacin) 600 mg iv.
7. Når barnet er forløst gis oxytocin 3 I.E. iv etter forespørsel fra gynekolog.

Dersom Oxytocindrypp ordineres, er standard blandingsforhold 50 IE Oxytocin i 500 ml NaCl 0,9%, hastighet 150 ml/time.

(TIPS: I akutte situasjoner for raskere administrering: 10 IE Oxytocin i 100ml NaCl 0,9%)

Kryssreferanser

[I.4.8.1.2-15](#)

[Postpartum blødning. Føde/Barsel SSHF \(PPB\)](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-7](#)

[Sectio - Grad I SSK](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-8](#)

[Sectio - Grad 2 SSK](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-20](#)

[Prostifinem - medikamentell behandling av postpartum blødning](#)

[II.SOK.KKK.FBK.2.2-3](#)

[Sectio. Føde/Barsel SSK](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: S Ose, K Menning	Først utgitt: 17.02.2007	Fagansvarlig: Stefan Hylér	Godkjent av: Grete Kruger Erdvik	□
---	------------------------------------	--------------------------------------	--	---