

		Somatikk Arendal		Prosedyre	
Hudtransplantasjon SSA					
Dokument ID: II.SOA.KIA.K-A.2.4-1		Godkjent dato: 11.05.2023		Gyldig til: 11.05.2025	
Side 1 av 1 Revisjon: 5.02					

Somatikk Arendal/Kirurgisk avdeling SSA/Kirurgi SSA/Pasienter og brukere/Plastikk

Generelt

Hudtransplantasjoner skal ikke foretas ved påvist streptokokk- eller pseudomonasinfeksjoner. Sårflaten skal være så ren som mulig når hudtransplantasjon foretas.

Forberedelse

- Blodprøver etter gjeldende Dips-profil
- Svar på sårsekret dyrkning skal foreligge
- Hårklipping etter prosedyre
- Premedikasjon etter prosedyre

Operasjonsdagen

- Rommet skal rengjøres i henhold til isoleringsregime, hvis det er påvist bakterier som staph. aureus, pseudomonas etc.
- Pasienten skal tilbakeføres posten til rent rom etter inngrepet

TA REDE PÅ OM DET ER UTFØRT DEL- ELLER FULLHUDSTRANSPLANTASJON.

Postoperativ sårbehandlingsprosedyre 1. – 7. dag

- Trykkbandasjen skal ligge i 5-7 dager.
- Donorsted skal observeres daglig med hensyn til lekkasje gjennom bandasjen
- Hvis lekkasje, skal kun ytterbandasjen skiftes
- Bandasjering av donorsted ved delhudstransplantasjon: Aquacel legges på donorflaten for å beskytte mot lekkasje og for å forlenge liggetiden til den okklusive platen. Bandasjeskift utføres etter behov om det oppstår lekkasje eller bandasjen er helt gjennomblødd.
- Bandasjering av donorsted ved fullhudstransplantasjon: Micropore på små sår. Micropore, tørre kompresser og Hypafix på større sår.
- Alle hudtransplanterte skal gis Fragmin 5000 IE x 1 s.c. etter prosedyre

Postoperativ sårbehandlingsprosedyre etter 7. dag

- Sårskift x 1 dgl.
- Hvis hudtransplantatet har "tatt", rull forsiktig med tuffere over hudflaten, slik at overskytende væske under transplantatet tørkes bort
- Lufttørr transplantatet i ca. ½ time
- Legg på Mepitel eller Jelonet i transplantatets størrelse, 2 tørre kompresser, fikser det hele med vatt og Hypafix og/eller elastisk bind.
- Sting (eller agraffer) seponeres 12.-14. dag avhenger av transplantatets størrelse
- Huden rundt transplantatet smøres med jordnøttolje eller fuktighetskrem.

Kryssreferanser

[II.SOA.AIO.SSA.2.1-29](#) [Premedikasjon til kirurgiske pasienter over 16 år](#)

Utarbeidet av: Torill B. Gauperaa/Øyvind Vennesland	Fagansvarlig: Gudjon Gunnarsson	Godkjent av: Jeanne Mette Goderstad	
---	---	---	--