

**Informasjon om blødningsrisiko ved endoskopi, Med.avd., SSK**

Side 1 av 1

Dokument ID:

**II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL.1-15**

Godkjent dato:

**25.10.2023**

Gyldig til:

**25.10.2025**

Revisjon:

**6.00**

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

## BLØDNINGSRISIKO VED ENDOSKOPI

### Endoskopiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi, ERCP, endoskopisk ultralyd). Forberedelse angående blødningsrisiko.

Endoskopiske prosedyrer suppleres ofte med biopsi eller terapi. En må derfor ta hensyn til blødningsrisiko. Hos pasienter som bruker antikoagulantia (Marevan), bør INR ligge under 2,0 (2,5) før undersøkelsen starter. Dette oppnås ved at Marevan seponeres 2-4 dager før inngrepet. INR skal sjekkes undersøkelsesdagen og svar skal foreligge før undersøkelsen.

Enkel platehemmer kan tas som vanlig, men pasienter som står på dobbel platehemming må pause dette i 5 dager.

Antikoaguleringsmedikamenter (Marevan og Eliquis) Pauses i 2 dager.

Årsaken til at pasienten er antikoagulert må tas med ved vurderingen, obs kunstige hjerteventiler.