

**Ultralyd RAD-SSA: Pasientforberedelser og etterbehandling**

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**II.MSK.Rad SSA.2.12-1**

Godkjent dato:

**15.11.2023**

Gyldig til:

**15.11.2025**

Dato endret:

**15.11.2023**

Revisjon:

**9.06**

Medisinsk serviceklinikk\Radiologisk avdeling SSA\Pasienter og brukere\Ultralyd

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 15.11.2025 uten endringer i dokumentet.

**HENSIKT:**

Formålet er å lag en oversikt som kan knyttes til avdelingens ultralydprosedyrer.

Undersøkelse	Forberedelse						Etterbehandling		Kommentar
	Faste	Premedisinering	Full blære	PVK	Blodprøve	Innleggelse	Sengeleie	Drikke og spise etter	
<b>Generelle undersøkelser</b>									
UL hals/halskar/hode	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	
UL abdomen/Pancreas/lever	Ja, 4t	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Helst faste fra midnatt
UL nyrer/urinveier/blære	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	
UL scrotum	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	
UL aorta	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	
UL overekstremitet	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	
UL underekstremitet	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Hvis positiv DVT skal pasienten ikke gå etter undersøkelsen.
<b>Intervensjoner:</b>									
UL Pleuratapping/ascitestapping	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja	Obs. blodfortynnende
UL innleggelse av PleurX dren	Ja, 4t	Ja, ved behov	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja, 2 timer	1 timer	Obs. blodfortynnende Hvis eksisterende dren må det avstenges 2 dager før
UL abdomen intervensjon	Ja, 5t	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja, 2 timer	2 timer	Obs. blodfortynnende
Ul lever biopsi	Ja, 5t	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja, 2 timer	2 timer	Obs. blodfortynnende
Ul nyre biopsi	Ja, 5t	Ja	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja, 2 timer	2 timer	Obs. blodfortynnende BT og puls måles hver time de første 4t på avd.
UL innleggelse av suprapubisk blærekateter	Ja, 4t, unntak bør drikke rikelig inntil 2t før	Ja, ved behov	Ja	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja	Obs. blodfortynnende Eksisterende blærekateter må stenges av 2t i forkant av undersøkelsen.
FNAC	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	

- **Full blære** innebærer rikelig drikke (1 liter) 1 time før undersøkelsen.
- **Faste** innebærer at pasienten ikke skal spise, drikke, tygge tyggegummi eller røyke minimum før u.s. Unntak; innleggelse av suprapubisk blærekateter. Kan drikke inntil 2 timer før, men ellers faste.
- **Listen er en anbefaling** og kan fravikes ved akutt intervensjon
- **Premedisinering** kan være aktuelt på alle intervensjoner og bør vurderes iverksatt av henvisende lege.
- **Blodprøver:** se tabell under.

<b>Hb</b>	<b>&gt;7 g/dl</b>
<b>Trombocytter</b>	<b>&gt;70</b>
<b>INR (ved bruk av marevan eller leversvikt samt ved manglende blødningsanamnese)</b>	<b>Generelt ≤ 2,2 Pleura/ascitestapping ≤ 2,5</b>

 Ved spørsmål om antikoagulatina se egen prosedyre: [Anbefalinger angående seponering av blodfortynnende ved inngrep](#)

DokumentID:D13513

Utarbeidet av: <b>Darlene Sandvik</b>	Fagansvarlig: <b>Kjetil Bredeesen</b>	Godkjent av: <b>Avd. leder Inger Wenche Nilsen</b>	Verifisert av:
--	--	---	----------------