

		<b>PASIENTER OG BRUKERE</b>		<b>Prosedyre</b>
<b>DELEGERING AV SMERTESTILLENDENDE BEHANDLING TIL VOKSNE PASIENTER MED STERKE SMERTER - AKUTTMOTTAK SSK</b>				Side 1 av 1
Dokument ID: <b>II.SOK.MEK.SSK.2.a-6</b>	Gruppe: <b>□</b>	Godkjent dato: <b>30.04.2025</b>	Gyldig til: <b>30.04.2027</b>	Revisjon: <b>10.00</b>

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

## Bakgrunn

Delegering av smertestillende og kvalmestillende medikamenter fra seksjonsleder i akuttmottak til sykepleier i akuttmottak.

## Hensikt

Sikre at pasienter med sterke smerter får rask, effektiv og god smertelindring. Dette er spesielt viktig i forkant av røntgenundersøkelse og smertefulle prosedyrer.

## Omfang

Prosedyren gjelder kun for voksne pasienter. Vakthavende lege på avdelingen pasienten tilhører, skal informeres før smertelindrings-prosedyren iverksettes.

## Handling

Sykepleier administrerer smertestillende og kvalmestillende medikamenter på følgende måte:

<b>Pasienter &gt; 50 kg som ikke har leversykdom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol® 1 g supp eller Paracetamol® 1 g iv</li> </ul>
<b>Pasienter &lt; 50 kg som ikke har leversykdom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol® 1 g supp</li> <li>Paracetamol® iv etter anbefalt dosering i felleskatalogen</li> </ul>
<p><b>For all administrering av paracetamol; vær obs på døgndose. Ved administrering av i.v. paracetamol, vær obs på hypotensjon.</b></p>	
<b>Pasienter &gt; 50 kg, &lt; 70 år, uten alvorlig lungesykdom/nevrologisk sykdom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oxynorm® 2,5 mg iv, gjenta eventuelt med 1,25 mg iv med 5 minutters mellomrom til smertelindring. Max 7,5 mg</li> <li>Se blandekort</li> </ul>
<b>For pasienter &lt; 50kg og/eller &gt; 70 år</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halve doser</li> </ul>
<b>Ved behov for doser utover dette</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakt vakthavende lege</li> </ul>
<b>Ved behov for kvalmestillende</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zofran 4 mg iv</li> </ul>
<p><b>Pasienter som har fått opioider skal monitoreres etter at medisinen er gitt. Vitale parametere dokumenteres i MetaVision og ny NEWS tas før hver dose.</b></p>	

### [I.3.2-33 Blandekort voksne - OKSYKODON \(Oxynorm®\) - SSHF](#)

Utarbeidet av: <b>Chris Peter Grasaas-Albrecht/Ruth Gudrun S. Thue/Benedicte Severinsen</b>	Først utgitt: <b>23.11.2006</b>	Fagansvarlig: <b>Anne Catrine Nyberg</b>	Godkjent av: <b>Anne Catrine Nyberg</b>	□
--	------------------------------------	---	--	---