

 SØRLANDET SYKEHUS			Somatikk Kristiansand	Generelt dokument
Delhudstransplantasjon Kirurgiske Senger SSK, post 3C				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.KSK.3C.2..2-6	Godkjent dato: 17.09.2025	Gyldig til: 17.09.2027	Revisjon: 5.02	

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

Omfang: Prosedyren gjelder for sykepleiere og hjelpepleiere.

Hensikt: Å sikre at pasienten får forsvarlig og god sykepleie/behandling.

Ansvar: Leder har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Sykepleier som utfører prosedyren er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Definisjon: Transplantasjon av hud p.g.a. brannskade, sår eller traume.

Fremgangsmåte/gjennomføring: Preoperativt:	- Forundersøkelser: blodprøver, rtg. thorax, Ekg, pre- og post-operativ fysioterapi, samtale med sykepleier, turnuslege, kirurg og anestesilege etter prosedyre - Blodprøver: Kir/ort profil + INR hvis pasienten bruker Marevan - Bestill INR og evt. fastende blodsukker som «straks/akuttprøve» til kl. 06.30 operasjonsdagen. - Kirurg må «merke» pasienten før operasjon - Faste fra kl. 24.00 – ikke spise fast føde etter kl. 2400. Kan drikke vann/saft/te/kaffe uten melk frem til 2 timer før oppmøte. Kan røyke, snuse, tygge tyggegummi eller suge på drops frem til 2 timer før oppmøte. Medisiner som skal operasjonsdagen kan svelges sammen med et lite glass vann frem til 1 time før operasjonen - Samtale med turnuslege, kirurg, anestesilege og sykepleier - Evt. EKG - Rtg. Thorax – forordnes av lege - Tromboseprofylakse kvelden før - forordnes av lege - Venekanyle	Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF Preoperativ faste - Voksne - SSF Hudtransplantasjon Pasientinformasjon SSHF PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF
Operasjonsdagen:	- Dusje, rent tøy og ren seng - Hårfjerning i operasjonsområdet - Premedikasjon etter forordning av lege - Antibiotika profylakse dersom indisert. Første dose gis under oppstart av operasjon - Blodsukker svar hvis diabetes - insulindrypp - INR svar hvis Marevan	Premedikasjon voksne pasienter, Anestesi SSK Preoperativ hårfjerning, SSHF Antibiotikabruk i sykehus - nasjonal veileder, godkjent i SSHF. Diabetes, innleggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK. (ARKIVERT)
Postoperativt: Hud/Hygiene:	- Bandasjer over transplantasjonen, og evt. VAC bandasje, åpnes 5. p.o. dag. - Husk å observere donorsted ifht infeksjon, og se etter at bandasjene ikke glir (grundig bandasjering) - Donorsted skal vanligvis ikke skiftes de første dagene med mindre det er mistanke om infeksjon	
Mobilisering:	Immobilisering av pasient i 5 dager dersom hudtransplantatet på underekstremitet er bandasjert uten VAC, dvs. at pasienten kan opp i rullestol med foten hevet og i ro 1. p.o. dag. Pasienten kan ikke gå med krykker og lignende, med mindre operatør har gitt annen beskjed. Enkelte pasienter kan ha do-lov, men dette må avtales med kirurg individuelt.	

Utarbeidet av: Karin Moi	Fagansvarlig: Andreas Nygaard	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	
------------------------------------	---	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS		Delhudstransplantasjon Kirurgiske Senger SSK, post 3C, Post 4A			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.KSK.3C.2..2-6	Utarbeidet av: Karin Moi	Fagansvarlig: Andreas Nygaard	Godkjent dato: 17.09.2025	Godkjent av: Mette Christine Emanuelson	Revisjon: 5.02

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

Smerter/velvære	- Basis/fast medikasjon - Obs. virkning/bivirkning etter NRS skala - Paracet 1g x 4 - Evt. medikamenter ved behov - forordnet av lege	
Ernæring:	Pasienten kan spise ved ankomst avdeling	
Utskrivning	- Utskrivning etter transplantatet er avdekket - Kontrolltime ved behov - Resept smertestillende ved behov - Evt. sykemelding	

Kryssreferanser

- 1) [Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF](#)
- 2) [Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)
- 3) [Antibiotikaproylakse - basert på nasjonal retningslinje](#)
- 4) [PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF](#)
- 5) [Preoperativ faste - Voksne - SSFPreoperativ faste - Voksne - SSF](#)
- 6) [Diabetes, inneliggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK. \(ARKIVERT\)](#)
- 7) [Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

Eksterne referanser