

 Somatikk Kristiansand		Prosedyre
Rutiner i forbindelse med kontroll og oppstart av cytostatika		Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.KKK.GPK.2-7	Godkjent dato: 11.06.2025	Gyldig til: 11.06.2027
		Revisjon: 1.03

Somatikk Kristiansand/Kvinneklubben SSK/Kvinneklubben poliklinikk SSK/Pasienter og brukere

HENSIKT:

Å kvalitetssikre fremgangsmåten ved cytostatika behandling.

ANSVAR:

Både sykepleier og lege har ansvar.

HANDLING:

- Epikrise fra DNR /notat fra overlege på KK må foreligge.
- Notat med frase fra sykepleiere før kur må foreligge (vekt, nevropati mm) skal i regelen være ferdig før kl 14.00 dagen før kur.
- Kvalmeregime må være avklart
- Ecco cor eller mugascan må være tatt og kontrollert før oppstart med Caelyx (doksyrubicin)
- Blodprøvesvar for kur må foreligge ifølge CMS.
- Lege fyller ut rekvisisjon og ordinerer cytostatika. Helst dagen før kur
- 2 sykepleiere kontrollerer veneflon, hastighet, sidedrypp og de enkelte cytostatika. Følg arbeidsskjema i CMS. Det er viktig med dobbel sjekk og signering gjennom alle deler av kuren. Man må ikke starte infusjoner som ikke er kontrollert.
- Lege må være tilgjengelig og i nærheten (på poliklinikken) den første halve timen ved Taxol spesielt, men også til pasienter som har hatt reaksjoner.
- En lege har ansvar, slik at sykepleier til enhver tid vet hvem som kan tilkalles.

Kryssreferanser: <https://cms.ha.sykehuspartner.no/CMS/>

Eksterne referanser

Utarbeidet av: vibeke Eriksen	Fagansvarlig: Vistad	Godkjent av: Ikke styrt	
---	--------------------------------	-----------------------------------	--