

Observasjoner, stell, og fjerning av dren, bølgedren og pigtailkateter Kirurgiske senger SSHF

 Dokument ID:
I.3.FEL.8-2

 Godkjent dato:
17.09.2025

 Gyldig til:
17.09.2027

 Revisjon:
4.05

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Sykepleie

Omfang:

Prosedyren gjelder for sykepleiere og omhandler sykepleie til pasient med innlagt vakumdren/bølgedren.

Ansvar/myndighet:

Leder har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Sykepleier som utfører prosedyren er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Definisjon/hensikt:

Sårdræn/vakumdren og bølgedren blir lagt inn under operasjonen i sårhulen for å drenere sårveske/lymfevæske/abscess. Sårdræn/vakumdren blir suturert fast til huden. Drenet kan være med- eller uten vakuum – dette bestemmes av operatør. Fjernes etter legens ordinasjon.

Pigtail kateteret er festet med en tråd/sutur. Fjernes etter legens ordinasjon.

- Bølgedren kan være suturert fast eller ligge løst i sårhulen. Hvis det ligger løst i sårhulen er det festet en steril sikkerhetsnål i bølgedrenet like ved huden for å forhindre at bølgedrenet ikke "forsvinner" inn i sårhulen.

OBSERVASJON, STELL OG FJERNING AV DREN, BØLGEDREN OG PIGTAILKATETER	
Stell av dren:	<ul style="list-style-type: none"> • Splittkompress på innstikkstedet - legges rundt/under drenet slik at ikke drenet gnager på huden. Steril kompress legges over innstikkstedet. Alt skiftes hver 3. dag eller ved blodsøl.
Tømming av drencposen	<ul style="list-style-type: none"> • Drenet tømmes før sugenheten fylles helt opp med væske for å forhindre at vakumet reduseres/oppheves. <ul style="list-style-type: none"> - Drencposen skiftes 1 gang/døgn, og væske mengden dokumenteres i pasientens journal - Dren med sug - Klem av drenet med den øverste klemmen. Åpne den nederste klemmen og klem væsken som er samlet i ballongen ned i drencposen. Fest den nederste klemmen igjen, og åpne den øverste klemmen - For passivt drencposen åpnes begge klemmene. Pass på at ikke ballongen klemmes sammen slik at det ikke blir sug – legg evt. ballongen/posen i sengen (samme nivå som såret) for å unngå sug – eller for evt. å oppheve suget klem av drenet med den øverste klemmen - ta av drencposen slik at luft slipper inn i ballongen
Observasjoner av dren:	<ul style="list-style-type: none"> • Infeksjonstegn som hevelse, rødme, temperatur og pussdannelse

 Utarbeidet av:
Karin Moi

 Fagansvarlig:
Alf Ole Tysland / Carl Tobias Hammarlund

 Godkjent av:
Tone Kristin Hansen

Dokument-id:
 I.3.FEL.8-2

 Utarbeidet av:
 Karin Moi

 Fagansvarlig:
 Alf Ole Tysland / Carl
 Tobias Hammarlund

 Godkjent
 dato:
 17.09.2025

 Godkjent av:
 Tone Kristin Hansen

 Revisjon:
 4.05

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Sykepleie

	<ul style="list-style-type: none"> Mengde/karakter på væsken At drenet/kateteret er i korrekt posisjon 	
Fjerning av dren: <ul style="list-style-type: none"> Rene hansker Sterile kompresser Suturkniv Sterile kompresser Mefix 	Fremgangsmåte for fjerning av vakumdren: <ul style="list-style-type: none"> Vurder profylaktisk smertelindring. Klem av vakumdrenet med den øverste klemmen så nær koblingen (pasienten) som mulig ca. 15 minutter før fjerning. Pasienten informeres om å slappe av/puste rolig mens prosedyren utføres Fjern suturer Hold igjen rundt innstikkstedet med en steril kompress mens drenet trekkes ut med en jevn og fast bevegelse. Vri drenet og dra med et fast drag. (Kontakt lege hvis det fortsatt sitter fast) Komprimer med steril kompress over innstikksted i 3-5-min. Legg på steril kompress La pasienten ligge i 5-10 min etter fjerning, observer evt. blødning i etterkant 	
Forkorting av bølgedren: Utstyr: <ul style="list-style-type: none"> Sterile hansker Steril saks Steril sikkerhetsnål Steril splittkompress Mefix 	Fremgangsmåte for forkorting av bølgedren: <ul style="list-style-type: none"> Fjern bandasjen Dra drenet ut tilsvarende den lengden som skal klippes av Fest ny steril sikkerhetsnål i bølgedrenet like ved huden – skal forhindre at bølgedrenet ikke «forsvinner» inn i sårhulen Klipp av drenet med en steril saks Legg steril splittkompress rundt drenet under sikkerhetsnålen slik at den ikke gnager på huden. Ta på ny bandasje 	
Fjerning av bølgedren: Utstyr: <ul style="list-style-type: none"> Rene hansker Skiftesett Suturkniv Sterile kompresser Mefix 	Fremgangsmåte for fjerning av bølge dren: <ul style="list-style-type: none"> Evt. fjern suturer Bruk steril pinsett og trekk drenet ut med et fast drag. Legg på sterile kompresser og Mefix. La pasienten ligge i 5-10 min etter fjerning, observer evt. blødning i etterkant 	
Fjerning av pigtailkateter: klikk på link til høyre		Nefrostomikateter 1. gangsinleggelse, skifte, stell og fjerning SSHF

Kryssreferanser:
[Ureterstent innleggelse + fjerning](#) [Operasjonsheten SSK](#)
Eksterne referanser: