

		Fagspesifikke prosedyrer		Prosedyre
Bekken glandelstaging - laparoskopisk, robotassistert, åpen - SSHF				Side 1 av 2
Dokument ID: I.3.FEL.3-13		Godkjent dato: 05.09.2024	Gyldig til: 05.09.2026	Revisjon: 5.01


Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Urologi

Omfang: Prosedyren gjelder for sykepleiere og hjelpepleiere.

Ansvar: Leder har ansvar for at prosedyren er kjent og tilgjengelig i avdelingen. Sykepleier og hjelpepleier har ansvar for at prosedyren blir fulgt.

Definisjon: Når prostatakreft er påvist og det ikke er funnet spredning til skjelettet, kan det bli aktuelt med strålebehandling av prostata. Slik behandling forutsetter at det ikke er spredning til lymfeknutene i bekkenet. Noen av lymfeknutene fjernes og undersøkes av patolog.

Lymfeknuter i bekkenet kan fjernes enten ved åpen operasjon eller kikkhullskirurgi. Operasjonen utføres i narkose eller spinalbedøvelse. Ved kikkhullskirurgi legges tre til fire små snitt (1 cm) på nedre del av magen. Ved denne teknikken må ofte sædlederne deles for å komme til lymfeknutene. Det betyr at pasienten blir steril, men seksualfunksjonen er som før operasjonen.

Fremgangsmåte/ gjennomføring	Link til prosedyre
<p>Preoperative rutiner:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Samtale med sykepleier, kirurg, turnuslege og anestesilege SSK: Forundersøkelser kirpol SSA: Kirurg operasjonsdagen Blodprøver innkomstdagen: SSK: Profil Kir/ort, PSA + INR (Hvis pas bruker Marevan) SSA: Profil – lap. glandelstaging Bestill INR hvis pasienten bruker Marevan, og fastende blod sukker hvis diabetes som ø-hjelp til: SSK: kl. 06.30 operasjonsdagen SSA: kl. 07.00 operasjonsdagen Urinstix, evt. urinbaktus ved indikasjon på UVI – antibiotika forordnes av lege Evt. rtg. thorax forordnet av turnuslege Evt. EKG Påtegning av kirurg SSK: dagen før operasjon SSA: operasjonsdagen Faste før operasjon Tromboseprofylakse s.c. forordnet av lege Evt. venekanyle 	<p>Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF</p> <p>Antibiotikaproylakse urologi SSHF</p> <p>Fjerning av lymfeknuter ved prostatakreft - lymfadenektomi - Pasientinformasjon SSHF</p> <p>Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF</p> <p>SSK: Faste før anestesi/operasjon -voksne Anestesi SSK</p> <p>SSA: Preoperativ faste, voksne • ANE SSA</p> <p>PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF</p>
<p>Operasjonsdagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dusj, operasjonstøy + seng Hårfjerning i operasjonsområdet Premedikasjon forordnet av lege/anestesilege Evt. intravenøst væske pga. fasting – SSK: henges opp senest kl. 12.00 Insulindrypp + fastende blodsukker ved diabetes SSK: Diabetespasienter som skal til operasjon SSA: GIK INR svar hvis pasienten bruker Marevan 	<p>Preoperativ hårfjerning, SSHF</p> <p>SSK: Diabetespasienter som skal til operasjon, Kirurgiske Senger SSK (ARKIVERT)</p> <p>SSA: Diabetes mellitus: perioperativ behandling (GIK) (ARKIVERT)</p> <p>Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF</p>

Utarbeidet av: Karin Moi / Wenche Nordli	Fagansvarlig: Alf Ole Tysland/Carl T Hammarlund/Aage V. Andersen	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	
--	--	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS		Bekken glandelstaging - laparoskopisk, robotassistert, åpen - SSHF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.3.FEL.3-13	Utarbeidet av: Karin Moi / Wenche Nordli	Fagansvarlig: Alf Ole Tysland/Carl T Hammarlund/Aage V. Andersen	Godkjent dato: 05.09.2024	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	Revisjon: 5.01

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Urologi

Postoperativt: Diurese:	<ul style="list-style-type: none"> Blærekateter – fjernes vanligvis neste morgen etter ordinasjon av lege Observasjon av spontan vannlating etter fjerning av kateter 	
Sirkulasjon:	<ul style="list-style-type: none"> Obs BT + puls Bestill blodprøvekontroll 1. p.o. dag: Hgb 	
Ernæring:	<ul style="list-style-type: none"> Kan drikke og spise operasjonskvelden 	
Mobilisering:	<ul style="list-style-type: none"> Operasjonskvelden/ 1. p.o dag 	
Smarter/velvære:	<ul style="list-style-type: none"> Smertestillende forordnet av lege Paracet, evt. NSAID, evt. Oxynorm. Noen kan ha luft smerter i abdomen som forplanter seg helt opp til skulder region. 	
Hygiene:	<ul style="list-style-type: none"> Pasienten kan dusje 2-3 dager etter operasjonen Huden er lukket med: <ul style="list-style-type: none"> SSK: intracutan sutur (SSK) SSA: clips som fjernes hos fastlege etter 14 dager 	
Kontroll:	<ul style="list-style-type: none"> Utskrives som regel dagen etter operasjon Observer operasjonssnitt og skift bandasjer utskrivningsdagen Skal fortsette med Paracet første 3 dager Sykemelding – vanligvis 1-2 uker avhengig av yrke. Pasienter bør unngå tung fysisk aktivitet første 4 uker. Poliklinisk kontroll etter 2-3 uker – svar på patologiske prøver 	

Kryss referanser

- [1\) Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF](#)
- [2\) Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)
- [3\) SSK: Faste før anestesi/operasjon -voksne Anestesi SSK](#)
[SSA: Preoperativ faste, voksne • ANE SSA](#)
- [4\) PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF](#)
- [5\) Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)
- [6\) SSK: Diabetespasienter som skal til operasjon, Kirurgiske Senger SSK \(ARKIVERT\)](#)
[SSA: Diabetes mellitus: perioperativ behandling \(GIK\) \(ARKIVERT\)](#)
- [7\) Pasientinformasjon: Fjerning av lymfeknuter ved prostatakrefte - lymfadenektomi SSHF](#)
- [8\) Antibiotikaproylaksse urologi SSHF](#)
- [9\) Antibiotikabruk i sykehus - nasjonal veileder, godkjent i SSHF.](#)

Eksterne referanser

Bekken glandelstaging ved prostatacancer:

<http://www.oncolex.no/en/Prostata/Prosedyre katalog/BEHANDLING/Kirurgi.aspx?lg=procedureGroup>