

Lap. nefrektomi / nyrereseksjon - SSHF

 Dokument ID:
I.3.FEL.3-16

 Godkjent dato:
28.05.2025

 Gyldig til:
28.05.2027


 Revisjon:
7.00

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Urologi

Omfang: Prosedyren gjelder for sykepleiere og hjelpepleier.

Ansvar: Leder har ansvar for at prosedyren er kjent og tilgjengelig i avdelingen. Sykepleier og hjelpepleier har ansvar for at prosedyren blir fulgt, og at dokumentasjon noteres i pasientens journal.

Definisjon: Nyren eller deler av nyren fjernes som regel pga nyrekreft, eller fordi nyren ikke fungerer. Nyren fjernes helt eller delvis. Den friske nyren vil overta funksjonen etter at nyren er fjernet. Operasjonen kan utføres som kikkhullskirurgi eller åpent, og utføres i narkose. Ved kikkhullskirurgi benyttes 3-4 (1 cm) i tillegg til et 8-10 cm langt snitt hvor nyren hentes ut.

KIRURGISK BEHANDLING		Link til prosedyre
Preoperative rutiner: 	<ul style="list-style-type: none"> • Blodprøver innkomstdagen: Kir/ort profil – Nefrektomi samt INR(ved bruk av Marevan) • Bestill INR (Marevan) og fastende blod sukker (Diabetes) som ø-hjelp til kl 06.30 operasjonsdagen • Urinstix, evt. urinbaktus ved positiv stix – antibiotika forordnes av lege • Samtale med sykepleier, turnuslege, kirurg og anestesilege. • Merking av operasjonsfelt av kirurg • Hårfjerning i operasjonsområdet – fra sternum til symfyssen • Faste fra kl. 24.00 – ikke spise fast føde etter kl. 24.00. -kan drikke vann/saft/te/kaffe uten melk frem til 2 timer før oppmøte. -kan røyke, snuse, tygge tyggegummi eller suge på drops frem til 2 timer før oppmøte. -medisiner på selve operasjonsdagen kan svelges sammen med et <i>lite</i> glass vann frem til 1 time før operasjonen • Venekanyle kvelden før operasjon 	Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF Faste for anestesi/operasjon -voksne Anestesi SSK
Operasjonsdagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Dusj, navlevask, rent operasjonstøy + seng • Ta på kompresjonsstrømper, som pas har fått utdelt på FUS. • Premedikasjon forordnet av lege/anestesilege • Intravenøst væske pga fasting • Insulindrypp + fastende blodsukker ved diabetes • INR svar hvis pasienten bruker Marevan 	Diabetespasienter som skal til operasjon, Kirurgiske Senger SSK (ARKIVERT) Diabetes mellitus: perioperativ behandling (GIK) (ARKIVERT)

Forordning av medikamenter preoperativt og postoperativt

	Operasjonsdag	Videre 1.-2. po. dag	3. po dag
Morgen/ pre - medikasjon	KUN Nyrereseksjon	Bactrim 4 tbl hvis ikke allergi	
	Nyrereseksjon + nefrektomi	Paracet 1,5 - 2 g etter anesthesiord.	Perfalgan iv 1 g x4
		Oxycontin 5 – 10 mg før operasjon	Oxycontin 5 – 10 mg x2
	Evt steroider etter anesthesiord.	Duphalac 15 x2	Duphalac 15 ml x 2
Opr kveld	Oxycontin 5 – 10 mg vesp		
	Duphalac 15 ml vesp		
	Klexane 40 mg om kvelden opr dag		
Ved behov	Oxynorm 2,5 mg i.v. eller 5 mg p.o. ved behov	Oxynorm 2,5 mg i.v. eller 5 mg p.o. ved behov	Oxynorm 2,5 mg i.v. eller 5 mg p.o. ved behov

		Lap. nefrektomi / nyrereseksjon - SSHF			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: I.3.FEL.3-16	Utarbeidet av: Karin Moi	Fagansvarlig: Alf Ole Tysland/ Aage V. Andersen	Godkjent dato: 28.05.2025	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	Revisjon: 7.00

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Urologi

Smerter/velvære	<ul style="list-style-type: none"> Smertestillende forordnet av lege. Noen kan ha luft smerter i abdomen som forplanter seg opp til skulder region. Alle pasienter får satt Marcain i såret peroperativt. Første 24 t gis Perfalgan 1 g x 4 i.v, deretter overgang til Paracet tabletter p.o. Det skal ikke gis Voltaren eller andre NSAID. Oxynorm 5 mg ved behov, evt. Oxynorm i.v. forordnet av lege 	
Postoperativt: Diurese:	<ul style="list-style-type: none"> Blærekateter – fjernes vanligvis 1. p.o. dag etter ordinasjon av lege Måle og dokumentere døgn diurese i pasientkurven – dvs væske inn/ væske ut fram til utreisedato. Diurese må også registreres ved <u>hvert vaktskifte</u> Observasjon av spontan vannlating etter fjerning av kateter 	Bladderscan Kirurgiske Senger - SSK
Dren kun ved nyrereseksjon	<ul style="list-style-type: none"> 1. p.o. dag – visittgående lege skal observere drenevæsken – derfor SKAL IKKE drencposen tømmes/byttes før lege gått visitt Aktivt dren fram til 1. p.o. dag – seponeres etter legens forordning 	
Sirkulasjon:	<ul style="list-style-type: none"> OBS! BT/ PULS x 2 pr. vakt Bestill blodprøvekontroll: <ul style="list-style-type: none"> 1. p.o. dag: Hb, Kreatinin 2. p.o. dag: Post op. Ktr. 3.dagsprøve 4. p.o. dag: Post op. Ktr. 3. dagsprøve 	
Ernæring	<ul style="list-style-type: none"> Kan drikke og spise operasjonskvelden 	
Mobilisering	<ul style="list-style-type: none"> 2 x pr. vakt 	
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Pasienten får ofte hudklips i huden som fjernes etter 12-14 dager hos egen lege Noen pasienter får kun intrakutan sutur. Dusj 2-3 dager etter operasjonen. 	
Kontroll:	<ul style="list-style-type: none"> Pasienten utskrives etter 2 – 4 dager Skift bandasjer utskrivningsdagen - observer operasjonssnitt Kontroll hos operatør 3-4 uker etter operasjonen avtales eller ettersendes <ul style="list-style-type: none"> Blodprøver noen dager før konsultasjonen; Hb, Na, K, Kreat, CRP Pasienten må unngå tunge løft eller hard fysisk aktivitet 4-6 uker etter operasjonen Evt. resept på smertestillende Sykemelding vanligvis 4-8 uker avhengig av yrke 	

Kryssreferanser

[I.2.11-1](#)

[I.2.11-25](#)

[Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF](#)

[Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	Lap. nefrektomi / nyrereseksjon - SSHF				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: I.3.FEL.3-16	Utarbeidet av: Karin Moi	Fagansvarlig: Alf Ole Tysland/ Aage V. Andersen	Godkjent dato: 28.05.2025	Godkjent av: Mette Christine Emanuelson	Revisjon: 7.00

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Urologi

[I.3.23-10](#)

[Antibiotikaproylakse urologi SSHF](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.c-2](#)

[Faste før anestesi/operasjon -voksne Anestesi SSK](#)

[II.SOK.KSK.FEL.2.S-3](#)

[Bladderscan Kirurgiske Senger - SSK](#)

Eksterne referanser