

 Somatikk Kristiansand		Prosedyre
ERCP / Papillotomi Med.avd. SSK		Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GAS-5	Godkjent dato: 17.12.2023	19.4.2015 Revisjon: 8.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

Hensikt

Endoskopisk røntgenundersøkelse av galle og bukspyttkjertelgang.
Evt. inngrep i galleveier.

Omfang

Det er legene på gastrolab som utfører undersøkelsen på røntgenavdelingen i 1 etg.
Det føres et bevegelig skop ned i magesekken, deretter over i tolvfingertarmen der galle-og bukspyttkjertelgang munner ut. Det sprøytes inn kontrast, og tas rtg.bilder.

Indikasjoner

Magesmerter : mistanke om gallestein, gallegangstenose, betennelse i galleblære/bukspyttkjertel, tumor

Forberedelse

FASTER fra midnatt, kan drikke vann inntil 1 time før undersøkelsen.
Pasienten bør ha veneflon på høyre hånd på grunn av liggestilling under undersøkelsen (venstre side)
Nødvendige morgenmedisiner kan gis etter avtale med lege, kan svelges med ½ gl vann.
Ved bruk av Marevan – husk kontroll av INR
Fyll ut: **Skjema for undersøkelse ved gastrolab.**
Kurve og navnelapper sendes med til undersøkelsen.

Voltaren supp 100 mg skal gis før undersøkelsen.(profylakse mot pankreatitt)Gis av sykepleier på gastrolab.
Pasienten får lokalbedøvelse i svelg, og avslappende og smertestillende medikamenter iv før undersøkelsen.
Undersøkelsen varer ca ½ - 1 time. [Pasientinformasjon om ERCP, Med.avd., SSK](#)

Gastrolab orienteres dersom pasienten:

- behandles for alvorlig hjertesvikt eller nyresvikt
- har diabetes som er insulinkrevende
- bruker blodfortynnende medikamenter eller har blødningstendens
- har hatt diare over lengre tid

Etter undersøkelsen

FASTE i 2 timer, deretter drikke litt vann, - og flytende kost resten av dagen hvis ingen annen beskjed.
Frokost neste dag hvis flytende kost forrige døgn ikke har gitt ubehag.

Observasjoner

BT, puls, temp, resp og SaO2 x 2 etter undersøkelse. Ofte ved behov.
Økende magesmerter. Se punkt under.

Komplikasjoner

- Pankreatitt; - obs sterke magesmerter
 - Blødning; - obs melena, Hb-fall.
 - Cholangitt; - obs feber.
 - Perforasjon (etter papillotomi); - obs smerter, feber.
- } - kontakt lege

Kryssreferanser [Pasientinformasjon om ERCP, Med.avd., SSK](#)
Gastrolab

Utarbeidet av: Hilde Sandvand Balchen	Fagansvarlig: Audun Hasund	Godkjent av: Asbjørn Stallemo	
---	--------------------------------------	---	--