

		Somatikk Kristiansand		Prosedyre	
Leverbiopsi Med.avd, SSK					
Dokument ID: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GAS-4		Godkjent dato: 26.10.2022		19.4.2015	
				Revisjon: 8.00	

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

HENSIKT

Denne undersøkelsen gjøres ved mistanke om sykdom i lever.
 Leveren undersøkes med ultralyd, og det settes bedøvelse i huden før en tynn nål stikkes inn.
 Det tas ut en vevsbit (biopsi) fra lever som sendes til undersøkelse.

OMFANG

Det er lege på Gastrolab som gjennomfører undersøkelsen

FORBEREDELSE

Blodprøvekontroll med INR og trombocytter må foreligge på alle pasienter før undersøkelse.

Bruk av platehemmer/antikoagulasjon skal være avklart med ansvarlig lege

FASTE fra midnatt dagen før undersøkelsen. (Faster i 8 timer)

Undersøkelsesdagen: Kan drikke vann inntil 1 time før undersøkelse. Morgenmedisiner kan tas med 1 gl vann.

Skjema for undersøkelse ved gastrolab fylles ut og legges i plastmappe sammen med navnelapper

Plastmappe følger med pasienten til undersøkelsen

ETTER UNDERSØKELSEN

Pasienten skal ligge i ro i 1 time etter undersøkelsen.

Faste i 1 time etter undersøkelsen.

Polikliniske pasienter kan reise hjem etter 2 timer

Ved hjemreise samme dag får pasienten med informasjonsskriv «Pasientinformasjon leverbiopsi» i EK-web.

OBSERVASJONER

Kontroll: news x 2 eller oftere ved mistanke om komplikasjoner

Observasjoner: blødning, smerte, feber -> kontakte lege

Kryssreferanser

Gastrolab

Utarbeidet av: Hilde Sandvand Balchen	Fagansvarlig: Audun Hasund	Godkjent av: Hilde Torjussen Hauge	
---	--------------------------------------	--	--