

Ascitestapping Med.avd., SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.GAS-3

Godkjent dato: 19.4.2013

23.01.2023

Gyldig til:

23.01.2025

Revisjon:

7.01

Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere\Sykepleiefaglig

Hensikt

Ascitesvæske er en ansamling væske i mage/bukhulen. Væsken lokaliseres ved hjelp av UL- apparat. Den tappes ved å føre en tynn nål gjennom bukveggen. Hensikten kan være både terapeutisk, smertelindrende og diagnostisk.

Omfang

Undersøkelsen utføres av lege enten på gastrolab eller radiologisk avdeling.

Forberedelse

Informere pasienten.

Ved bruk av blodfortynnende medikamenter, husk INR kontroll

Kurve og navnelapper følger med pasienten til undersøkelsen.

Undersøkelsen

Pasienten ligger på rygg mens undersøkelsen foregår, - dette kan ta ca 30 minutter.

Lokal bedøvelse gis før undersøkelsen

Om det er bestilt prøver av ascitesvæske, utføres prøvetaking av personalet på radiologisk avdeling eller gastrolab.

Etter undersøkelsen

Kontroll: TILT

Transfusjon av albumin i.v ved tapping av store mengder ascites. Utførende lege ordinerer dette ved behov.

Observere : økende magesmerter, feber, blødning - kontakt lege

Kryssreferanser

Gastrolab

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Hilde Sandvand Balchen	Fagansvarlig: Audun Hasund	Godkjent av: Asbjørn Stallemo	
---	--------------------------------------	---	--