

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Kristiansand		Retningslinje
Medisinering i akuttsituasjoner ved intensiv, SSK				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.a-35		Godkjent dato: 14.10.2025	Gyldig til: 14.10.2027	Revisjon: 8.01

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

Dette er en **ordinasjon** av enkelte medikamenter for sykepleiere som er ansatt ved Intensiv seksjon Kristiansand - inkludert sykepleiere i videreutdanning som har sin praksis ved intensiv SSK, - samt sykepleier-vikarer.

Ordnasjonen av Adrenalin, krever i tillegg årlig sertifisering av AHLR.

I visse situasjoner er det nødvendig at sykepleier kan gi medikamenter uten skriftlig ordinasjon fra lege. Det forutsettes da at sykepleier er kjent med medikamentets effekt og bivirkninger, samt forsiktighetsregler ved bruk av det aktuelle medikament.

AKUTTSITUASJONER / ANDRE MEDIKAMENTER:

Voksne: Ved lavt BT (Syst BT < 80 og puls < 70): **Efedrin** 10 mg i.v. (50 mg/ml - 0,2 ml)

Voksne: Ved lavt BT (Syst BT < 80 og puls > 70): **Fenylefrin** 0,1 mg i.v. (0,1 mg/ml – 1 ml)

Voksne: Ved bradykardi (HF < 40/min): **Atropin** 0,5 mg i.v. (1mg/ml – 0,5 ml)

Voksne: Ved hjertestans: **Adrenalin** 1 mg iv (1 mg/ml – 1 ml)

Barn: Ved hjertestans: **Adrenalin** 10 mcg/kg iv (0,1 mg/ml – katastrofe Adrenalin – 0,1 ml/kg)

REFERANSER:

1. [Medisinering uten forutgående ordinasjon av lege - SSHF](#)
2. [Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp](#)
3. [Legemiddelhåndtering for virksomheter som yter helsehjelp - Rundskriv IS-9/2008](#)

Utarbeidet av: Fagspl. Frode Kleveland	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Peter Bohge	Godkjent av: Grethe Kruger Erdvik	
--	--	-----------------------------------	--