

Dobbelkontroll ordinasjon av lege- Barneseksjonen/ Barne- og ungdomsavdelingen

Side 1 av 1

Dokument ID:

I.4.3.12-6

Godkjent dato:

22.05.2023

Gyldig til:

22.05.2025

Revisjon:

2.05

Fagspesifikke prosedyrer\Barn og unge\Legemiddelhåndtering

1.0 Hensikt:

Sikre riktig dosering fra lege av potente legemidler til barn og unngå feildosering

2.0 Metode:

Følgende medikamentdoseringer skal dobbeltkontrolleres av annen lege. Dersom ikke annen lege er tilgjengelig skal sykepleier (K) sammen med lege gjennomgå og kontrollere at doseringen er korrekt. Etter kontroll signere begge i kurven.

Følgende medikamentdoseringer skal dobbeltkontrolleres:

Alle cytostatika

Opiater og medikamenter til sedasjon- kont. infusjon:

Fentanyl infusjon

Insulin infusjon

Midazolam infusjon

Morfininfusjon

Vasoaktive medikamenter:

Dopamininfusjon

Adrenalin infusjon

Morfininfusjon

Prostivasinfusjon

Digoxin/digitoxin po/iv

Annet:

Insulin infusjon

Høykonsentrerte elektrolyttinfusjoner (Na, K, Mg)

Inflksimab (Remicade)

Kryssreferanser**Eksterne referanser**

Utarbeidet av: Kåre Danielsen	Fagansvarlig: Ole Bjørn Kittang	Godkjent av: Avd.leder Kåre Danielsen	
---	---	---	--