

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Flekkefjord		Prosedyre
Leverbiopsi Med pol SSF				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOF.MEF.M-F.1.1.1-2		Godkjent dato: 18.12.2024	Gyldig til: 18.12.2026	Revisjon: 7.01

Somatikk Flekkefjord/Medisinsk avdeling SSF/Medisin SSF/Pasienter og brukere/Med poliklinikk Pasient og brukere SSF

Forberedelse:

- Pasienten kalles inn via mottakelse, skal legges inn på OBS-post til observasjon etter biopsien.
- Mottakelsen avtaler tidspunkt med med. pol.(sekretær)
- Blodprøver dagen før eller samme dag: blodgruppe, hematologi, INR. Resultatet må foreligge før prosedyren starter.

Blodfortynnende:

- Ved bruk av andre blodfortynnende enn Albyl-E, som for eksempel Marevan, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Plavix eller Brilique, må lege vurdere behov for kontroll av INR og/eller pause i forhold til medikamentet før undersøkelsen. **Aktuell INR må foreligge når pasienten står på Marevan.**

Undersøkelsesdagen:

- Pasienten skal være fastende i 6 timer, men kan drikke vann inntil 3 timer før undersøkelsen.
- Undersøkelsen gjøres på medisinsk poliklinikk.
- Pasienten ligger i seng.
- BT måles før undersøkelsen.

Utstyr:

- Usterilt borddekke
- 1 sterilt borddekke (stor)
- Sterile hansker (nr. 7,5, 8, 8,5)
- Steril frakk
- Skiftesett
- Hullaken
- Klorhexidin 5 mg/ml
- Steril kompress
- 1 stk 10 ml sprøyte
- Sprøytespisser, gul, blå og grønn
- Lang sprøytespiss, grønn. (0,80 x 120 mm.)
- Skalpell
- Lidocain 10 mg/ml, 20 ml hetteglass
- Glass med bufret formalin 10 % (formaldehyd 4%)
- NaCl 9 mg/ml, 10 ml ampulle
- Sterilt plaster
- Ultra-Pro II Needle Guide. (steril kopling og overtrekkssett for ultralydprobe.)
- TruCore II URO biopsi-instrument (festes til ultralyd proben, for veiledet biopsi)
- Egen flergangskopling til ultralydprobe (i skap på Pallenschat kontor)
- Ultralyd-apparat

Biopsi sammen med histologiskjema sendes SSK (internpost)

Evt. sendes til Rikshospitalet med eget sendeskjema (eksternpost)

Utarbeidet av: Inger Lise S. Gausdal	Fagansvarlig: Jens Pallenschat	Godkjent av: Monica Ringsbye	
--	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Leverbiopsi Med pol SSF				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOF.MEF.M-F.1.1.1-2	Utarbeidet av: Inger Lise S. Gausdal	Fagansvarlig: Jens Pallenschat	Godkjent dato: 18.12.2024	Godkjent av: Monica Ringsbye	Revisjon: 7.01

Somatikk Flekkefjord/Medisinsk avdeling SSF/Medisin SSF/Pasienter og brukere/Med poliklinikk Pasient og brukere SSF

Overvåkning etter biopsien:

- Streng sengeleie i 1 time, sengeleie etterpå men kan gå på toalettet.
- BT/ puls måles hver ½ time de to første timene.
- Pasienten kan spise etter 2 timer, dersom alt er normalt
- Pasienten utskrives som regel etter 4 timer. Evt. overnatting dersom reisevei til sykehuset > 1 time.

Mulige komplikasjoner:

- Komplikasjonsrate ca 0,25 %. 1/3 av komplikasjonene oppdages mer enn 2 timer etter biopsien.
- Lette smerter rundt biopsistedet, evt. med utstråling til høyre skulder er ikke uvanlig.
- Vær obs på følgende: blødning, pneumothorax / hemothorax, perforasjon av galleblæren, infeksjon.

Kryssreferanser

Eksterne referanser