

Undersøkelser

[Forrige side](#)

Puls:

- Lyske
- Knehaser
- Fot

Måle ankel/ arm indeks:

- Blodtrykksmåling i ankel og arm. Dette gjøres ved hjelp av ultralyd apparat (Doppler).




Referanse:

Slagsvold CE, Stranden E. Venøse leggsår. Tidsskrift Nor Lægeforening 2005; 125: 891-4.
<http://tidsskriftet.no/article/1171306>

Muskelvenepumpefunksjon:

- Årsaken til at enkelte pasienter med venøs svikt utvikler sår og andre ikke, kan forklares ut fra muskelvenepumpefunksjonen.



Undersøk dette i forhold til hvilket kompresjonsbind som skal brukes:

- Stivhet i kne og ankel pga. artrose
- Stivhet i kne og ankel etter tidligere operasjoner/frakturer
- Leggmuskelpumpen svekkes pga. lammelser/nevrologiske lidelser
- Innaktivitet av diverse årsaker.

Duplex (ultral lyd):

- Duplex er en ultralydundersøkelse for utredning av åreknutesykdom. Denne gjøres poliklinisk på karkirurgisk poliklinikk, og tar ca. 20 minutter. Det kreves ingen forberedelse for å utføre denne undersøkelsen. Pasienten er stående mens årene undersøkes fra lysken ned mot kneet og på baksiden av leggen.
<http://tidsskriftet.no/article/1911041>

Biopsi/ Vevsprøve

- Dersom et venøst legg sår responderer dårlig på lokalbehandling og forblir uendret etter 3-6 måneders behandling, anbefales biopsi for å utelukke annen sykdom.

Referanse:

Slagsvold CE, Stranden E. Venøse leggsår. Tidsskrift Nor Lægeforening 2005; 125: 891-4.
<http://tidsskriftet.no/article/1171306>

Blodprøver

- Tas ift til anamnese.¹
- Blodstatus og C-reaktiv protein er kun indisert når det foreligger kliniske tegn til infeksjon.
- Utredning av koagulopatier ved residiverende tromboser eller familieanamnese.

Referanser:

Clinical practice guidelines. The nursing management of patients with venous leg ulcers.
http://www.rcn.org.uk/_data/assets/pdf_file/0003/107940/003020.pdf (05.06.2012).