

## VENTRIKKELSKYLLING - AKUTTMOTTAK SSK

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOK.MEK.SSK.2.a-27

Gruppe:

[]

Godkjent dato:

08.05.2024

Gyldig til:

08.05.2026

Revisjon:

4.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

## BAKGRUNN

### Hensikt

Ventrikkeltømming /-skylling bør kun utføres dersom man forventer en alvorlig forgiftning og agens er inntatt peroralt.

### Indikasjon

- Fare for alvorlig forgiftning og
  - **≤ 1 time** etter inntak av flytende stoff og **≤ 2 timer** etter inntak av fast stoff.
  - **Senere i forløpet** ved
    - svært alvorlig forgiftning eller fare for svært alvorlig forgiftning (meget stor dose eller meget giftig stoff)
    - nedsatt gastrointestinal bevegelse, for eksempel ved antikolinerge stoffer (midler som hemmer det parasympatiske nervesystem), opioider eller ved dyp bevisstløshet
    - inntak av depotpreparat
    - inntak av tungtfordøyelig materiale, for eksempel planter og sopp

### Kontraindikasjon

- Bevisstløse pasienter eller pasienter uten svelgerefleks som ikke er intubert.
- Motvillige pasienter
- Inntak av etsende stoffer. Ved inntak av større mengder syre, kontakt Giftinformasjonen.
- Inntak av petroleumsprodukter med stor aspirasjonsfare. Ved inntak av større mengder petroleumsprodukt, kontakt Giftinformasjonen.
- Fedmeoperert
- Ikke tilhelede operasjonssår eller lignende i GI-tractus

[]

Utarbeidet av:

**M.Hauge fag.spl,  
O.H.Jonassen ane.spl**

Først utgitt:


**06.09.2012**

Fagansvarlig:

**Anne Catrine Nyberg**

Godkjent av:

**Anne Catrine Nyberg**

		<b>Ventrikkelskylling - akuttmottak SSK</b>			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.MEK.SSK.2.a-27	Utarbeidet av: M.Hauge fag.spl, O.H.Jonassen ane.spl	Fagansvarlig: Anne Catrine Nyberg	Godkjent dato: 08.05.2024	Godkjent av: Anne Catrine Nyberg	Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

## Fremgangsmåte

### Personell

Det skal under prosedyren alltid være minst to personer tilstede.

### Monitorering

Pasienten skal monitoreres på scop, med kontinuerlig SpO2 måling, hjerterefrekvens måling og blodtrykk før og etter prosedyren.

### Gjennomføring

- Finn frem alt utstyr, heng opp settet etter det er fylt med lunket vann. Klipp tuppen på settet som skal kobles sammen med sonden. Gjør klar sonde, dekk deg selv til med frakk, hansker og det anbefales munnbind med visir. Klargjør kullet som eventuelt skal settes ned tilslutt ved å riste tubene godt og lenge, samt klippe opp forseglingen. Sørg for at ut-posen som ligger på gulvet er lukket godt.
- Munnspærre settes inn og ventrikkelsonde føres ned i svelget. Bruk størst mulig dimensjon på sonden for å få suget opp for eksempel tabletter.
- Aspirer først innhold i ventrikkelen, dette med sprøyte som ligger i settet.
- Skyll deretter med lunkent vann til klart skyllevann. Bruk omtrent 200 ml om gangen til voksen og 100-150ml til barn. Denne prosedyren gjentas mange ganger, til det er tomt i beholderen og / eller det kun kommer klar væske opp i retur.
- Hvis indisert sett ned medisinsk kull etter siste skyllevann. Intuberte pasienter bør i så fall ikke ekstubereres før kullet har passert ventrikkelen.

### Utstyr

Utstyret står ferdig pakket på akuttrom 2. Innhold i utstyrsbrettet er følgende:

- Ventrikkelskyllingssett – engangs med kull 1 stk
- Magesonde – str 30 2 stk
- Magesonde – str 24 2 stk
- Gule smittefrakker 2 stk
- Munnbind m/visir
- Kladd

### Forsiktighetsregler

Vær svært observant på pasientens bevissthetstilstand. Dersom pasienten er bevisstløs, lite kontaktbar eller sløv, og man likevel skal gjennomføre ventrikkeltømming, skal man ha svært lav terskel for å kontakte anestesipersonell for å ha kontroll på pasientens luftveier under prosedyren.

### Eksterne referanser

- [Gastric Lavage for Removal of Toxic Substances: Performing - NRC](#)
- [Tidsskriftet.no/ventrikkeltømming - Rygnestad/Nordmo/Jacobsen](https://tidsskriftet.no/ventrikkeltømming)
- [Ventrikkelskylling - Helsebiblioteket](#)