

**PICC-line - indikasjon for innleggelse**Dokument ID:  
**I.2.11-10**Godkjent dato:  
**09.04.2026**Gyldig til:  
**09.04.2028**Revisjon:  
**1.06**

Generelle prosedyrer/Andre tverrgående prosedyrer/retningslinjer

**Målgruppe:**

Pasienter som trenger sentralvenøs tilgang

**Hensikt:**

Sikre at pasienten får riktig intravenøs tilgang

**Ansvar:**

- Behandlende lege henviser til anestesivdelingen via DIPS. Anestesilege kontaktes i tillegg dersom det haster.
- PICC-lineteam legger kateter etter indikasjon er godkjent av anestesilege

**Indikasjon:**

- Langvarig behov (utover 1-2 uker) for i.v tilgang (eks: langvarig antibiotika behandling)
- Hjemmebehandling med i.v.
- Parenteral ernæring
- Særlig vevsirriterende medikamenter (eks: cytostatica, cordarone, vancomycin)
- Ved kontraindikasjon for standard SVK (eks: antikoagulasjon og redusert lungefunksjon)
- Særlig utfordrende PVK (veneflon) innleggelse
- Blodprøvetaking i spesielle tilfeller (eks: utfordrende å stikke, hyppige blodprøver, angst for stikk)

**Relative kontraindikasjoner:**

- Ikke egnet pasient
- Lokal infeksjon eller trombose i arm
- Lymfødem (eks pga axilletoilette)
- Særlig trombosen tilstand
- Alvorlig koagulopati
- Allergi mot katetermateriale

**Annen informasjon:**

PICC-line innleggelse utføres fortrinnsvis på operasjonsstuen. Kateteret innlegges ultralydveiledet under sterile forhold. Etter utført prosedyre tas røntgenkontroll.