

		<b>Fagspesifikke prosedyrer</b>		<b>Retningslinje</b>
<b>Diabetes behandlingslinje - Bytte fra insulinpumpe til penn, Barne- og ungdomsavdelingen.</b>				Side 1 av 1
Dokument ID: <b>1.3.3.4.1-7</b>		Godkjent dato: <b>04.05.2026</b>	Gyldig til: <b>04.05.2027</b>	Revisjon: <b>3.01</b>

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Endokrinologi med diabetes/DIA - Behandlingslinje Nyoppdaget diabetes

### Hensikt:

Trygge overgang fra bruk av insulinpumpe til multi injeksjonsbehandling

### Ansvar:

Behandleren legen, eller delegert til diabetes sykepleier på poliklinikken.

### Tiltak:

Fortsett med de samme måltidsdosene med hurtigvirkende insulin Fiasp, NovoRapid eller Lyumjev. Bruke samme IK og KF verdier som ved bruk av insulinpumpe.

Erstatt basaldosen med langtidsvirkende insulinanalog (Lantus, Levemir) gitt en gang daglig. Settes med penn til middag eller kvelds og gis på samme tid hver dag.

Dosen justeres ut i fra glukoseverdi påfølgende morgen.

Kontroller glukoseverdi 1-2 ganger de første nettene, ellers som vanlig.

### **Kryssreferanser**

#### **Eksterne referanser**

Felleskatalogen pr oktober 2019

Hanås R. Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne. 2015

Utarbeidet av: <b>Prosjektgruppe ved Unni Mette Köpp</b>	Fagansvarlig: <b>Ulrikke Bakke Fors</b>	Godkjent av: <b>På vegne av fagdirektøren Ole Bjørn Kittang</b>	
---	--	--	--