

Innleggelse av veneport (VAP)


Innleggelsen foregår i lokalbedøvelse, evt. med tillegg av avslappende medikamenter.

Venepor (VAP = Venous Access Port) består av et lite injeksjons kammer som legges under huden og som har tilgang til en sentral venøs blodåre gjennom et kateter, se illustrasjon.

VAP- kammeret legges under huden like nedenfor kragebeinet. Inngrepet utføres ved hjelp av ultralyd og røntgengjennomlysning. Etter inngrepet vil det bli tatt et røntgenbilde for å dokumentere at kateteret ligger på rett plass.

Når en VAP er i bruk vil det være en tynn nål med tilhørende slange festet i selve porten. Nålen må skiftes hver 7-10 dag, og bortsett fra dette vil du slippe andre stikk.

En VAP kan du ha over lang tid, og den kan brukes til både å ta blodprøver av og/eller til å gi de medikamentene du behøver.



Etter innleggelsen:

Smerter

Etter innleggelsen kan det være noe ømt og stivt i området rundt VAP-en noen dager. Dette er helt normalt og paracetamol (Paracet) er ofte tilstrekkelig som smertestillende. Se pakningsvedlegget for dosering.

Sår/hygiene

Hold bandasjen tørr. Dersom den blir våt eller gjennomtrukket av blod, må den byttes. Ta evt kontakt med avdelingen som behandler deg for hjelp til sårskift.



trygghet når du trenger det mest

Du kan dusje etter 48 timer, men dekk da til såret med plastfolie.

Unngå bading til såret er grodd, ca. 10 dager.

Såret er sydd med tråd som forsvinner av seg selv.

Stripsene skal stå på til de faller av. Etter at såret er grodd, trenger du ingen bandasje når porten ikke er i bruk.

Arret etter en VAP er ofte lite, men for å få penest mulig arr kan det være en fordel å tape arret de første 3 månedene etter at denne er fjernet. Unngå direkte sollys på arret det første året.

Aktivitet

Du bør unngå direkte slag mot VAP-en. Ellers er det ingen restriksjoner på fysisk aktivitet.

Kontakt sykehuset/avdelingen som behandler deg dersom:

- du får symptomer på infeksjon. Symptomer kan være ømhet/rødhet/puss rundt såret, evt. feber og frysninger
- du får tiltakende tungpust og /eller stikkende respirasjonsavhengige smerter i brystet. Dette kan være tegn på blodpropp

Ha info - kortet med deg dersom du skulle ha behov for helsehjelp på et annet sykehus.

Kontakt

Sørlandet sykehus Arendal: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 37 07 56 51. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, ring sykehuset på telefon 906 10 600 og spør etter vakthavende anestesilege.

Sørlandet sykehus Kristiansand: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 15.00 på telefon 38 03 84 41. Ved spørsmål som ikke kan vente til neste dag, kontakt akuttmottak på tlf. 38 07 34 21 eller din lokale legevakt.

Sørlandet sykehus Flekkefjord: Kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 18.00 på tlf 38 32 97 18. Etter klokka 18.00 kontakt 38 32 72 90.

Har du spørsmål senere enn 48 timer etter operasjonen ber vi deg kontakte avdelingen som har ansvaret for deg.

Kontroll

Det er avdelingen som behandler deg som har ansvar for videre oppfølging og stell av VAP-en.

trygghet når du trenger det mest