

Innleggelse av Hickman - kateter


Operasjonene foregår i lokalbedøvelse, evt. med tillegg av avslappende medikamenter.

Hickman - kateter er et kateter som blir lagt inn i en av de større blodårene i kroppen. Et kammer (se bilde) blir plassert under huden, slik at kateteret gror fast i løpet av 2-3 uker.

Når Hickman - kateteret er operert inn, vil du ha et stykke av kateteret utenfor huden. Kateteret har ofte to eller tre innganger. Når kateteret ikke er i bruk, skal inngangene alltid være lukket med klemme.

Etter inngrepet vil det bli tatt et røntgenbilde for å dokumentere at kateteret ligger på rett plass.

Kateteret skal behandles sterilt for å unngå infeksjon.



Etter operasjonen:

Smerter

Etter innleggelsen av kateteret kan det være noe ømt og stivt i området. Dette kan vedvare noen dager og er helt normalt. Paracetamol (paracet) er ofte tilstrekkelig som smertestillende medikamenter. Se pakningsvedlegget for dosering.

Sår/hygiene

- Vær nøye med håndvask i forbindelse med håndtering av kateteret/skifte av bandasje.
- Du kan dusje etter 48 timer, men den fuktige bandasjen må byttes etterpå. Ved dusjing legges kateteret i en engangshanske. Tape godt rundt hansken, fest den med åpningen ned ved skulderen.
- Hold bandasjene tørre. Dersom de blir våte eller gjennomtrukket av blod, må de byttes. Ta evt kontakt med avdelingen som behandler deg for hjelp til sårskift.
- Såret sys med en tråd som forsvinner av seg selv. Stripsene skal sitte på til de faller av.



trygghet når du trenger det mest

- Når sårene er grodd, dekkes kateterutløpet med gjennomsiktig film eller sterilt plaster som skiftes 2-3 ganger i uken. Er det tørt rundt kateterutløpet, vurderes det om du trenger bandasje over. Kateterenden beskyttes ved å pakke inn i steril kompress.
- Unngå bading til kateteret er grodd fast, ca 3 uker.

Aktivitet

Du bør unngå direkte slag mot Hickman kateteret, ellers er det ingen restriksjoner på fysisk aktivitet.

Kontakt sykehuset/avdelingen som behandler deg dersom:

- du får symptomer på infeksjon. Symptomer kan være ømhet/rødhet/puss rundt såret, feber og evt. frysninger
- du får hevelse i armen
- du får tiltakende tungpust og /eller stikkende respirasjonsavhengige smerter i brystet. Dette kan være tegn på blodpropp

Kontakt

Sørlandet sykehus Arendal: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 37 07 56 51. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, ring sykehuset på telefon 906 10 600 og spør etter vakthavende anestesilege.

Sørlandet sykehus Kristiansand: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 15.00 på telefon 38 03 84 41. Ved spørsmål som ikke kan vente til neste dag, kontakt akuttmottak på tlf. 38 07 34 21 eller din lokale legevakt.

Sørlandet sykehus Flekkefjord: Kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 18.00 på tlf 38 32 97 18. Etter klokka 18.00 kontakt 38 32 72 90.

Har du spørsmål senere enn 48 timer etter operasjonen ber vi deg kontakte avdelingen som har ansvaret for deg.

Kontroll

Det er avdelingen som behandler deg som har ansvar for videre oppfølging og stell av Hickman -kateteret.

trygghet når du trenger det mest