

Sædanalyse - Informasjon til pasienter og rekvirenter - MedBio SSHF

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.DKS.MBIO FEL.4.1.4-10

Godkjent dato:

10.12.2025

Gyldig til:

10.12.2027

Dato endret:

10.12.2025

Revisjon:

9.00

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Medisinsk biokjemi fellesdokumenter/Analyse/Metodebeskrivelser/Urin og sædanalyser

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Lab.håndbok. SSK: sædbenk. SSA: Resepsjonsluka, skap på patologilab.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ny godkjenning pga feil i EK. Endringer og saksgang jf. versjon 8.0

Sædanalyse utføres som oftest i forbindelse med infertilitetsutredning (barnløshet), refertilisering og etter sterilisering. Retningslinjen forklarer rutinene ved Sørlandet sykehus.

(Til rekvirent: Retningslinjen og skjemaer finnes i Laboratoriehåndboka til Sørlandet sykehus.)

Timebestilling:

Sørlandet sykehus, Arendal:

Tlf.: 37014558 (Telefontid hverdager kl. 09-15).

Time må bestilles på forhånd, drop-in er ikke mulig.

Sørlandet sykehus, Kristiansand:

Tlf.: 38073465 (Telefontid hverdager kl. 09-15).

Time må bestilles på forhånd, drop-in er ikke mulig.

Rekvisisjon

Pasienten må ha med rekvisisjon fra lege når prøven leveres.

Skjema til sædanalyse

Skjema til sædanalyse skal leveres samtidig med prøven. Øverste del av skjema skal fylles ut av ansvarlig lege.

Det finnes 2 typer skjema: «Skjema til sædanalyse ved infertilitetsutredning» og «Skjema til sædkontroll etter sterilisering». Oppdatert skjema finnes i laboratoriehåndboken.

Prøvetaking

Prøven tas ved masturbasjon mellom 2. og 7. døgn siden forrige samleie/sædavgang. Kondom dreper sædceller og skal ikke brukes. Hånd og penis vaskes før prøvetaking (brukes såpe må det skylles godt med vann). Sæden samles direkte i beger som fås fra rekvirerende lege eller ved henvendelse til laboratoriet. Kan også bruke sterilt beger fra apoteket. Hele sædmengden skal med i begeret.

 Prøven tas hjemme og **bringes til laboratoriet innen 1 time.** Om dette ikke er mulig kan prøven tas ved sykehuset.

Levering av prøven

Prøven må holdes varm under transporten til sykehuset. Oppbevar den gjerne i en innerlomme. Prøven bringes så hurtig som mulig til sykehuset. Pasienten henvender seg i ekspedisjonen til aktuell avdeling.

Sørlandet sykehus, Arendal: Laboratorieavdelingen, 3. etasje.

Sørlandet sykehus, Kristiansand: Enhet for spesialanalyser, 1. etasje (dør på venstre side, vis-à-vis kafeområdet. Ring på dørklokken når du kommer).

Resultat

Resultatet sendes elektronisk til rekvirerende lege. Rekvirenter som ikke har elektronisk overføring, får svar per post. Det er rekvirerende lege som formidler resultatet av prøven til pasienten.

DokumentID:D35535

Utarbeidet av: Fagbioingeniører Bente K. Omdal og Gunn Hilde Glamsland	Fagansvarlig: Fagbioing. Lisa Voldsjø og Bente K. Omdal	Godkjent av: Avd. leder Beate Sommer	Verifisert av: []
--	---	--	----------------------