

POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING TIL BARN, SSK


Side 1 av 1

Dokument ID:
II.SOK.AIO.SSK.2.d-3Gruppe:
□Godkjent dato:
10.02.2026Gyldig til:
10.02.2028Revisjon:
2.08

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Postoperativ smertebehandling til barn, SSK

Utarbeidet av Overlege Olav Søvik og intensivsykepleier Frode Kleveland, Sørlandets Sykehus Kristiansand, 2020



Veiledende bolusdoser for iv. Fentanyl: 0,5 mcg/kg

Vekt i kg: 10 = 10 x 0,5 mcg = 5 mcg Fentanyl
 : 15 = 15 x 0,5 mcg = 7,5 mcg Fentanyl
 : 20 = 20 x 0,5 mcg = 10 mcg Fentanyl
 : 25 = 25 x 0,5 mcg = 12,5 mcg Fentanyl
 : 30 = 30 x 0,5 mcg = 15 mcg Fentanyl, osv...

PR OS/ SUPP ANALGETIKA BARN > 3 MND

- Paracetamol Første dose: tbl. **40 mg/kg** (rund ned til passende tabl størrelse) Deretter **15 mg/kg hver 6. time.**

Vurder også etter legeforordning:

- Diclofenac 1-2 mg/kg hver **12 time.** (rund ned til passende tabl størrelse)
- **høyere dosering av fentanyl**
- **Oxycodon** (jf. prosedyre for smertebehandling til barn)

* CAS (Coloured Analog Scale)



Jf. EK: [smertebehandling av barn](#)
[smerteverktøy NRS og CAS](#)