

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Kristiansand		Generelt dokument
PEG-sonde, informasjon til avdelingen etter fjerning av peg-sonde/knapp Med. avd, SSK.				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-8		Godkjent dato: 07.01.2025	Gyldig til: 07.01.2027	Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

PEG -sonde, fjerning peg-sonde/knapp

Informasjon til avdelingen etter at PEG-sonden/knapp er fjernet og ikke erstattet med noe annet.

Omfang

Proseduren gjelder for sykepleiere og hjelpepleiere og omhandler observasjon/handling etter at PEG sonden er fjernet og ikke erstattet med en annen form for gastrostomiport, eks: Knapp.

Hensikt

Sikre at pasienter som har fjernet PEG sonden/knapp får en forsvarlig og god sykepleie, samt forebygge komplikasjoner.

Handling

Etter at PEG sonden er fjernet lukker hullet inn til ventrikkelen seg i løpet av kort tid. Behold en liten bandasje over til det er helt tørt.

Pasienten kan spise/drikke fritt etterpå dersom ingen annen beskjed er gitt.

En sjelden gang vil det kunne være vedvarende sekresjon fra PEG-kanalen over uker/mnd. Pasienten må da henvises til gastrolab.