


Fjerning av svulst i urinblæren via urinrøret – transuretral reseksjon av blæretumor, TUR-B

Om operasjonen

De fleste svulster i urinblæren er ondartede og må fjernes. Et instrument (resektoskop) føres gjennom urinrøret, og svulsten fjernes med en elektrisk slynge. Operasjonen varer ca. 30 min og utføres i spinalbedøvelse eller narkose.

Vevet sendes til patologisk undersøkelse, og vil avgjøre videre oppfølging.



Mulige komplikasjoner

- Blødning: Dersom det ikke er store mengder blod er ikke dette noe å engste seg for. Blør det mye, eller vannlatingen stopper oppsøk lege
- Urinveisinfeksjon
- Blæreperforasjon (hull i blæren), forekommer sjeldent

Følger av operasjonen

Det innvendige såret i blæren kan føre til hyppig vannlating og blod i urinen. Dette avtar ettersom såret leges over noen uker.

Forberedelser til operasjonen


- Dagkirurgiske pasienter møter operasjonsdagen, alle andre pasienter gjennomgår medisinske forberedelser enten poliklinisk noen dager før operasjonen eller ved innleggelse - dette omfatter journalopptak, blodprøver, urinprøve og evt. EKG og røntgenbilder
- Du får samtale med sykepleier, turnuslege, narkoselege og evt. kirurg
- Du må være fastende. Dette innebærer:
 - Du må ikke spise fast føde etter kl. 2400
 - Du kan drikke vann/saft/te/kaffe uten melk frem til 2 timer før oppmøte
 - Du kan røyke, snuse, tygge tyggegummi eller suge på drops frem til 2 timer før oppmøte
 - Medisiner som du skal ta på selve operasjonsdagen kan svelges sammen med et lite glass vann frem til 1 time før operasjonen.

Etter operasjonen

- Overvåking på postoperativ avdeling før overflytting til post
- Enkelte ligger med gjennomskylling av blæren noen timer etter inngrepet
- De fleste får cellegift i blæren via kateteret noen timer etter operasjonen
- Urinkateteret fjernes vanligvis dagen etter

Hjemreise

- Dagkirurgiske pasienter reiser hjem samme dag
- Innlagte pasienter reiser hjem vanligvis dagen etter operasjonen
- Time til poliklinisk kontroll avtales ved hjemreise eller ettersendes
- Sykemelding vanligvis 2-4 uker, men helt avhengig av svulstens størrelse og pasientens yrke



trygghet når du trenger det mest