

**Øyeskylling SSHF**Dokument ID:  
**II.SOA.ØYE.11-1**Godkjent dato:  
**27.03.2023**Gyldig til:  
**27.03.2025**Revisjon:  
**5.00**

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Sengepost

**Hensikt**

Prosedyren er en veiledning i hvordan skylle kontaminert øye med kontinuerlig skyllevæske.

**Ansvar**

Enhetsleder for at prosedyren er tilgjengelig.  
Sykepleier og hjelpepleier for at prosedyren blir fulgt.

**Indikasjon**

Pasienter som kommer inn med etseskade på øyet/øynene.  
Base eller syre mot øyet ( f.eks batterisyre, lut, kjemiske stoffer)

**Utstyr**

- Seng og Infusjonsstativ
- Evt oxibuprocain (bedøvelse-dråper) hvis smerter
- 1 liter NaCl infusjonsvæske 9mg/ml
- Infusjonssett
- Dansac skyllepose
- Egnede utstyr for å unngå vannsøl (Up-kladd, håndklær)
- Bøtte til oppsamling av vann

**Gjennomføring**

- Hvis smerter gi en dråpe Oxibuprocain i kontaminert øye
- Fest dansac posen til pasientens kinn, rundt øyet
- La posen henge ned i en bøtte for å samle opp skyllevann
- Fyll infusjonssettet med NaCl
- Fest slangen med tape over pasientens øye og la det renne godt ned i øyet
- Høy dråpetakt i 2-4 timer (det avgjør øyelegen)
- Ved smerter /ubehag gi Paracet/ParalginForte i samråd med lege

**Oppfølging**

- Lege vurderer når vi skal seponere øyeskyllet
- Pasienten reiser ofte hjem etterpå og føles opp av øyelegen etter behov