

Drypperegime med Cilox øyedråper ved keratitt - SSHF

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOA.ØYE.11-6

Godkjent dato:

09.10.2024

Gyldig til:

09.10.2026

Revisjon:

3.01

Somatikk Arendal\Øyeavdelingen\Sengepost

Hensikt

Riktig bruk av Cilox øyedråper.

Ansvar

Avdelingssykepleier har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig.

Sykepleier er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Indikasjon

Behandling av keratitt, forårsaket av Ciprofloxacinfølsomme bakterier.

Gjennomføring

Etter felleskatalogen:

Dag 1:

2 Dråper i øyet, hvert 15.min de første 6 timene.

Deretter 2 dråper hvert 30.min ut døgnet.

Dag 2:

2 Dråper hver time.

Dag 3:

2 Dråper hver 4. time

Eller etter legens forordning.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Dokument-id:
II.SOA.ØYE.11-6Utarbeidet av:
Wenche NordliFagansvarlig:
Erlend Sødal.Godkjent
dato:
09.10.2024Godkjent av:
Nina RolandRevisjon:
3.01

Somatikk Arendal\Øyeavdelingen\Sengepost